

Litfulo^{MD}
(ritlécitinib) capsules
50 mg

Familiarisez-vous avec **LITFULO**^{MD}

Un guide conçu pour vous aider à tirer
le maximum de votre traitement

Patiente fictive. Image utilisée
pour illustrer la maladie.



LITFULO est employé pour le traitement
de l'alopecie areata severe chez les adultes
et les adolescents de 12 ans et plus.

Introduction

Votre médecin vous a prescrit LITFULO (ritlécitinib) pour votre alopecie areata sévère.

Cette brochure explique ce qu'est LITFULO, comment il agit et ce que vous devez savoir avant de commencer votre traitement.

Les renseignements que renferme cette brochure ne visent pas à remplacer les directives et les conseils de votre médecin. Pour toute autre question, veuillez vous adresser à votre médecin ou pharmacien.

Veuillez aussi consulter le feuillet Renseignements destinés aux patients qui est collé au flacon de médicament.

Litfulo^{MC}
(ritlécitinib) capsules
50 mg



Au sujet de l'alopecie areata

Qu'est-ce que l'alopecie areata?

L'alopecie areata est une **maladie auto-immune** dans laquelle le système immunitaire s'attaque aux follicules pileux, nuisant à leur croissance normale et provoquant ainsi la chute des cheveux et des poils. Notons que bien que cette maladie cause la chute des cheveux et des poils, elle ne détruit pas les follicules pileux.

La perte de cheveux et de poils liée à l'alopecie areata se produit généralement sur le cuir chevelu, mais peut s'étendre à des zones comme les sourcils et les cils. Les patients peuvent connaître des moments pendant lesquels la perte de cheveux et de poils s'aggrave (récidive) et d'autres pendant lesquels les cheveux repoussent (rémission).

Qu'est-ce qui cause l'alopecie areata?

La cause exacte de l'alopecie areata est inconnue. Même si certaines données semblent indiquer qu'un stress physique ou émotionnel peut déclencher un épisode d'alopecie areata, de plus en plus de données montrent que la génétique et la fonction immunitaire jouent un rôle important.

Qui est touché?

Cette maladie touche les personnes de tout sexe, de tout âge et de toute origine ethnique. On estime que jusqu'à 2 % de la population mondiale pourrait être atteinte d'alopecie areata au cours de sa vie.

Quels sont les différents types d'alopecie areata*?

Chaque type d'alopecie areata est défini par l'ampleur de la perte de cheveux ou de poils et son emplacement.

- **Pelade en plaques**
Apparition de petites zones rondes dégarnies sur le cuir chevelu, les sourcils, les cils et/ou le corps
- **Alopecie totalis**
Perte complète des cheveux sur le cuir chevelu
- **Alopecie universalis**
Perte complète des cheveux et des poils sur le cuir chevelu, le visage et le corps

* Cette section n'est pas représentative de tous les types d'alopecie areata.

Au sujet de LITFULO

Qu'est-ce que LITFULO?

LITFULO est un médicament d'ordonnance utilisé pour traiter l'alopecie areata sévère chez les personnes de 12 ans et plus.

L'emploi de LITFULO chez les enfants de moins de 12 ans n'est pas approuvé.

Comment LITFULO agit-il?

LITFULO réduit l'activité de certaines enzymes, appelées « kinases », dans l'organisme. Cela a pour effet de changer le fonctionnement du système immunitaire et de diminuer l'inflammation, ce qui permet aux cheveux et aux poils de repousser chez les personnes atteintes d'alopecie areata sévère.

Administration de LITFULO

- Prenez une capsule, une fois par jour
- Avalez la capsule entière avec de l'eau
- Il ne faut pas couper, écraser, ni mâcher les pilules
- Prenez la capsule avec ou sans nourriture
- Gardez hors de la portée et de la vue des enfants
- Conservez LITFULO à la température ambiante (de 15 à 30 °C), dans son emballage d'origine



Patiente fictive. Image utilisée pour illustrer la maladie.

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre traitement par LITFULO, consultez votre médecin ou pharmacien.

Faites preuve de patience avec votre traitement.

Chaque patient peut répondre à LITFULO d'une manière différente; n'hésitez donc pas à communiquer avec votre médecin si vous ressentez de l'incertitude ou du découragement par rapport à l'évolution de votre traitement.

Après 36 semaines, votre professionnel de la santé évaluera les progrès de votre traitement. Il pourrait arrêter votre traitement selon votre réponse à LITFULO.



N'arrêtez pas de prendre LITFULO avant d'en avoir discuté avec votre médecin.



Patient fictif. Image utilisée pour illustrer la maladie.

Et si j'oublie de prendre une dose?

Prenez LITFULO dès que possible. Si votre prochaine dose est prévue dans moins de 8 heures, sautez la dose oubliée. Prenez la prochaine dose à l'heure habituelle.

Pour ne pas oublier de prendre LITFULO, il pourrait être pratique de **configurer un rappel** sur votre téléphone. Il peut aussi être utile de prendre le médicament à la même heure chaque jour.

Avant de commencer à prendre LITFULO

Ne prenez pas LITFULO :

- si vous êtes allergique au tosylate de ritlécitinib ou à tout autre ingrédient de LITFULO;
- si vous êtes enceinte ou avez l'intention de le devenir;
- si vous allaitez ou avez l'intention de le faire. Consultez votre médecin ou votre pharmacien pour savoir quelle est la meilleure façon de nourrir votre bébé pendant votre traitement par LITFULO;
- si vous avez des problèmes de foie sévères.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant et pendant le traitement par LITFULO si vous :

- avez une infection, y compris une infection qui ne guérit pas ou qui revient à répétition. Vous ne devez pas prendre LITFULO si vous avez une infection active;
- avez une maladie qui affaiblit le système immunitaire;
- prenez un médicament qui affaiblit le système immunitaire, puisqu'il est déconseillé de prendre LITFULO avec ces médicaments;
- vous avez récemment reçu un vaccin vivant ou atténué, ou prévoyez d'en recevoir un, y compris le vaccin contre le zona;
- avez une infection par le virus de l'hépatite B ou par le virus de l'hépatite C;
- avez récemment séjourné dans une région

- à forte prévalence d'infections fongiques;
- avez un faible nombre de plaquettes ou de globules blancs;
- avez, ou avez déjà eu, un cancer;
- avez des problèmes aux reins ou avez déjà eu une greffe de rein;
- êtes diabétique ou âgé de 65 ans ou plus, car ces personnes sont plus vulnérables aux infections;
- souffrez de troubles du cœur ou avez déjà fait un accident vasculaire cérébral (AVC) ou une crise cardiaque;
- avez déjà eu des caillots de sang dans les veines ou les artères de vos jambes, de vos poumons ou d'un œil;
- souffrez d'une maladie de la peau appelée « eczéma »;
- avez de la difficulté à digérer ou à dégrader certains sucres, un trouble appelé « intolérance au lactose ».

Les effets secondaires les plus courants de LITFULO comprennent la diarrhée, l'acné, une éruption cutanée, des étourdissements, une augmentation du taux d'une enzyme qu'on appelle créatine phosphokinase (selon une analyse sanguine) et la folliculite (inflammation des follicules pileux ou des pores).

Lorsque vous prenez LITFULO, vous pourriez ressentir des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés ci-dessous. Si c'est le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Le programme de soutien aux patients PfizerFlex

Du soutien tout au long de votre traitement



Votre professionnel de la santé vous a peut-être inscrit au programme PfizerFlex, un programme de soutien dont certaines caractéristiques ont été spécialement conçues pour répondre aux besoins des personnes atteintes d'alopecie areata sévère.

Nos services



Soutien direct, offert par notre équipe dévouée et votre infirmier ou infirmière PfizerFlex, pour répondre à vos questions sur le programme ou votre traitement par LITFULO



Expertise en matière de remboursement pour vous aider à trouver une couverture pour votre plan de traitement



Membres chevronnés pour vous aider à accéder à votre médicament le plus rapidement possible



Outils pratiques pour vous aider à explorer votre plan de traitement

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant le programme de soutien ou vous y inscrire, composez le 1-855-935-FLEX (3539) (du lundi au vendredi, entre 8 h et 20 h, HNE) ou envoyez un courriel à LITFULO@pfizerflex.com



Visitez le litfulo.ca pour en savoir plus

Utilisez le numéro d'identification du médicament (DIN) de LITFULO pour vous connecter au site Web. Le DIN est le numéro à 8 chiffres qui figure sur l'étiquette de LITFULO.

DIN : 02543532

[®] **Litfulo**[™]
(ritlécitinib) capsules
50 mg

© 2026 Pfizer Canada SRI
Kirkland (Québec) H9J 2M5
LITFULO et PFIZERFLEX,
respectivement M.D. et M.C. de
Pfizer Inc., Pfizer Canada SRI, licencié
PP-LGF-CAN-0048-FR

