Patientenkarte zur sicheren Anwendung

Cibinqo® (Abrocitinib)

▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Sie können dabei helfen, indem Sie jede auftretende Nebenwirkung melden.



Ihr Name
Name des Arztes*der Ärztin (der/die Ihnen Cibinqo® verschrieben hat)
Telefonnummer des Arztes*der Ärztin
Datum, an dem Sie mit der Einnahme von Cibingo® begonnen haben



Sicherheitsinformationen für Patient*innen zu Cibingo®:

- Diese Karte enthält wichtige Sicherheitsinformationen, derer Sie sich – vor und während der Behandlung mit Cibinqo® – bewusst sein sollten
- Für weitere Informationen lesen Sie die Packungsbeilage, welche in jeder Packung Cibingo® enthalten ist.
- Fragen Sie Ihren Arzt*Ihre Ärztin oder Apotheker*in, wenn Ihnen eine der Informationen unklar ist

Tragen Sie diese Karte immer bei sich, und zeigen Sie sie jedem medizinischen Fachpersonal, das an Ihrer medizinischen Behandlung beteiligt ist – zum Beispiel Ihrer Apothekerin*Ihrem Apotheker oder einem Notarrt*einer Notarrtin

Was ist Cibinqo® und wofür wird es angewendet?

Cibinqo® enthält den Wirkstoff Abrocitinib. Cibinqo® gehört zu einer Gruppe von Arzneimitteln, die Januskinase-Hemmer (Inhibitoren) genannt werden und die helfen, Entzündungen zu reduzieren.

Cibinqo® wirkt, indem es die Aktivität eines Enzyms im Körper namens "Januskinase" reduziert, das an Entzündungen beteiligt ist.

Cibinqo® wird zur Behandlung von Erwachsenen und Jugendlichen ab einem Alter von 12 Jahren mit mittelschwerer bis schwerer atopischer Dermatitis, auch als atopisches Ekzem oder Neurodermitis bekannt, eingesetzt. Durch eine Hemmung der Aktivität des Januskinase-Enzymes lindert Cibinqo® den Juckreiz und die Entzündung der Haut. Dadurch wiederum können Schlafstörungen und andere Folgen des atopischen Ekzems, wie z. B. Angstzustände oder Depressionen, verringert und die allgemeine Lebensqualität verbessert werden.

Sie sollten über die nachstehend angeführten Nebenwirkungen und Themen Bescheid wissen und mit Ihrem Arzt*Ihrer Ärztin sprechen, wenn Sie irgendwelche Nebenwirkungen bekommen:

Infektionsrisiken:

Bitte sprechen Sie vor und während der Behandlung mit Cibinqo® mit Ihrem Arzt*Ihrer Ärztin oder Apotheker*in, wenn Sie:

 Symptome wie Fieber, Wunden, übermäßige Müdigkeit oder Zahnprobleme bekommen, da diese Anzeichen einer Infektion sein können.

Impfungen:

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt*Ihrer Ärztin oder Apotheker*in, wenn Sie kürzlich eine Impfung (Immunisierung) erhalten haben oder demnächst erhalten werden – der Grund dafür ist, dass bestimmte Lebendimpfstoffe wie Röteln, MMR (Masern, Mumps, Röteln), Varizellen, Polio-Schluckimpfung, Typhus-Schluckimpfung, Gelbfieber unmittelbar vor und während der Behandlung mit Cibinqo® nicht empfohlen werden.

Risiko von Blutgerinnseln in den Venen oder in der Lunge:

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt*Ihrer Ärztin oder Apotheker*in, wenn Sie:

 plötzlich kurzatmig werden oder Atembeschwerden, Schmerzen in der Brust oder im oberen Rücken, Schwellungen in einem Bein oder Arm, Beinschmerzen oder Berührungsempfindlichkeit, Rötungen oder Verfärbungen in einem Bein oder Arm bemerken, da dies Anzeichen für Blutgerinnsel in den Venen sein können.

Risiko für Herzerkrankungen:

Bitte sprechen Sie vor und während der Behandlung mit Cibinqo® mit Ihrem Arzt*Ihrer Ärztin oder Apotheker*in, wenn bei Ihnen:

- starke Schmerzen oder ein Engegefühl in der Brust (das sich auf Arme, Kiefer, Hals und Rücken ausbreiten kann)
- Kurzatmigkeit
- kalter Schweiß
- Benommenheit oder
- plötzlicher Schwindel

auftreten, da dies Anzeichen für einen Herzinfarkt sein können.

Krebsrisiko:

Bei Patient*innen, die Cibinqo® einnahmen, wurde nichtmelanozytärer Hautkrebs beobachtet. Ihr Arzt*Ihre Ärztin kann Ihnen empfehlen, während der Einnahme von Cibinqo® regelmäßige Hautuntersuchungen durchführen zu lassen. Informieren Sie Ihren Arzt*Ihre Ärztin, wenn während oder nach der Therapie neue Hautläsionen auftreten oder wenn bestehende Läsionen ihr Aussehen verändern.

Laborkontrollen:

Ihr Arzt*Ihre Ärztin wird Sie bitten, vor Beginn und während der Behandlung mit Cibinqo® Laborkontrollen (einschließlich Untersuchungen auf hohen Cholesterinspiegel) durchführen zu lassen, und er*sie kann Ihre Behandlung entsprechend anpassen.

Empfängnisverhütung und Schwangerschaft:

Cibinqo® darf während der Schwangerschaft und Stillzeit **NICHT** angewendet werden.

Wenn Sie eine Frau im gebärfähigen Alter sind, sollten Sie während der Behandlung mit Cibinqo® und für mindestens 1 Monat nach Ihrer letzten Dosis Cibinqo® eine zuverlässige Methode zur Empfängnisverhütung anwenden. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt*Ihrer Ärztin über geeignete Methoden zur Empfängnisverhütung.

Informieren Sie Ihren Arzt*Ihre Ärztin umgehend, wenn Sie schwanger geworden sind oder glauben, dass Sie während der Behandlung schwanger geworden sein könnten.



Produkt mit finanziellem Klimabeitrag

ClimatePartner.com/12345-1001-1001

www.pfizer.at

Medieninhaber: Pfizer Corporation Austria GmbH, Wien Druck: HH Print Management Deutschland GmbH, Düsseldorf Stand der Information: August 2024 PP-AUT-CIBI-002-V003/08.2024

