

DAURISMO® im Sperma kann Schäden oder den Tod eines ungeborenen Kindes verursachen.

Männliche Patienten, die mit DAURISMO® behandelt werden:

- **müssen stets ein Kondom verwenden (mit einem Spermizid, falls verfügbar),** wenn sie während der Behandlung und in den 30 Tagen nach der letzten Dosis Geschlechtsverkehr mit weiblichen Partnern haben
- dürfen während der Behandlung mit DAURISMO® und in den 30 Tagen nach der letzten Dosis **kein Sperma spenden**

PP-GDG-AUT-0005/07.2020

DAURISMO® im Sperma kann Schäden oder den Tod eines ungeborenen Kindes verursachen.

Männliche Patienten, die mit DAURISMO® behandelt werden:

- **müssen stets ein Kondom verwenden (mit einem Spermizid, falls verfügbar),** wenn sie während der Behandlung und in den 30 Tagen nach der letzten Dosis Geschlechtsverkehr mit weiblichen Partnern haben
- dürfen während der Behandlung mit DAURISMO® und in den 30 Tagen nach der letzten Dosis **kein Sperma spenden**

PP-GDG-AUT-0005/07.2020

DAURISMO® im Sperma kann Schäden oder den Tod eines ungeborenen Kindes verursachen.

- Lassen Sie sich vor Beginn der Behandlung mit DAURISMO® **hinsichtlich einer wirksamen Erhaltung der Fertilität beraten.**
- **Melden Sie vermutete Schwangerschaften** Ihrer Partnerin einem Arzt oder einer Gesundheitsfachkraft.

Medieninhaber & Druck Pfizer Corp. Ges.m.b.H, 1210 Wien,
www.pfizer.at

DAURISMO® im Sperma kann Schäden oder den Tod eines ungeborenen Kindes verursachen.

- Lassen Sie sich vor Beginn der Behandlung mit DAURISMO® **hinsichtlich einer wirksamen Erhaltung der Fertilität beraten.**
- **Melden Sie vermutete Schwangerschaften** Ihrer Partnerin einem Arzt oder einer Gesundheitsfachkraft.

Medieninhaber & Druck Pfizer Corp. Ges.m.b.H, 1210 Wien,
www.pfizer.at