

PATIENTENPASS



012345



ENBREL®

Dieser Pass enthält wichtige Informationen zu Ihrer Sicherheit, die Ihnen bekannt sein müssen, bevor und während Sie mit Enbrel® behandelt werden. Sollten Sie zum Inhalt dieses Passes Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

- Zeigen Sie diesen Pass allen Ärzten, von denen Sie behandelt werden.
- Weitere Informationen finden Sie in der Enbrel®-Gebrauchsinformation.
- Bewahren Sie diesen Pass nach der letzten Enbrel®-Anwendung zwei Monate lang auf, da Nebenwirkungen auch erst einige Zeit nach Abschluss der Behandlung mit Enbrel® auftreten können.

Es ist wichtig, dass Sie und Ihr Arzt den Handelsnamen und die Chargenbezeichnung des angewendeten Arzneimittels protokollieren.

INFEKTIONEN

Enbrel® kann Ihr Risiko erhöhen, Infektionen zu bekommen, die schwerwiegend sein können.

- Sie sollten Enbrel® nicht anwenden, wenn Sie an einer Infektion erkrankt sind. Wenn Sie sich nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Arzt.
- Wenn Sie Anzeichen von Infektionen, wie z.B. Fieber, anhaltender Husten, Gewichtsverlust oder Antriebslosigkeit entwickeln, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Sie sollten auf Tuberkulose untersucht werden. Bitten Sie Ihren Arzt, unten die Daten und Ergebnisse der letzten Untersuchungen auf Tuberkulose zu notieren:

Test:

Datum:

Ergebnisse:

Test:

Datum:

Ergebnisse:

Bitten Sie Ihren Arzt, Ihre anderen Medikamente aufzulisten, die Ihr Infektionsrisiko erhöhen können.

HERZSCHWÄCHE (HERZINSUFFIZIENZ)

Wenn Sie Symptome entwickeln, die auf eine Herzschwäche oder eine Verschlechterung einer bestehenden Herzschwäche hindeuten, wie z.B. Kurzatmigkeit, Schwellung der Knöchel, anhaltender Husten oder Erschöpfung, suchen Sie sofort einen Arzt auf.



WEITERE INFORMATIONEN

Bitte ausfüllen:

Name des Patienten:

Name des Arztes:

Telefonnummer des Arztes:

www.pfizer.at

ENBREL®

