

## RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PATIENTS

### VEUILLEZ LIRE CE DOCUMENT POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DU MÉDICAMENT

#### PrBicillin<sup>MD</sup> L-A

#### Suspension pour injection de pénicilline G benzathine

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à recevoir Bicillin<sup>MD</sup> L-A et chaque fois que votre ordonnance est renouvelée. Ce feuillet est un résumé et il ne contient donc pas tous les renseignements pertinents au sujet de ce produit. Discutez avec votre professionnel de la santé de votre maladie et de votre traitement et demandez-lui si de nouveaux renseignements sur Bicillin<sup>MD</sup> L-A sont disponibles.

#### Mises en garde et précautions importantes

- Votre professionnel de la santé injectera Bicillin<sup>MD</sup> L-A dans un de vos muscles. Les injections non intentionnelles de Bicillin<sup>MD</sup> L-A dans un vaisseau sanguin ont été associées à des effets secondaires graves, voire mortels. L'injection du médicament dans un nerf ou à proximité d'un nerf pourrait entraîner des lésions permanentes à ce nerf.
- Chez certaines personnes prenant des antibiotiques de la classe des bêta-lactamines, comme la pénicilline, on a signalé des réactions cutanées sévères et des réactions allergiques graves, y compris la mort.
- Si vous avez déjà présenté une réaction allergique à la pénicilline ou à un autre antibiotique de la classe des bêta-lactamines, informez-en votre professionnel de la santé avant de commencer le traitement par Bicillin<sup>MD</sup> L-A.
- Pour plus d'information et pour connaître les autres symptômes :
  - voir la section « Consultez votre professionnel de la santé avant de recevoir... »;
  - voir la section « Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à Bicillin<sup>MD</sup> L-A? ».

#### Pourquoi utilise-t-on Bicillin<sup>MD</sup> L-A?

Bicillin<sup>MD</sup> L-A est utilisé pour traiter certaines infections bactériennes, telles que :

- angine streptococcique (une infection qui cause des maux de gorge [pharyngite]);
- syphilis (une maladie transmise au cours des rapports sexuels);
- pian, bégel et pinta (des maladies transmises à la suite d'un contact peau à peau).

Bicillin<sup>MD</sup> L-A est également utilisé pour prévenir les infections pouvant survenir à la suite d'une angine streptococcique, telles que :

- rhumatisme articulaire aigu (une maladie qui peut causer une maladie du cœur, des articulations, de la peau et du cerveau);
- glomérulonéphrite (une inflammation du rein).

Les antibiotiques comme Bicillin<sup>MD</sup> L-A sont utilisés pour traiter les infections bactériennes seulement. Ils ne sont pas efficaces contre les infections virales comme le rhume. Bien que vous puissiez vous sentir

mieux dès les premiers jours du traitement, il est important de continuer à prendre Bicillin<sup>MD</sup> L-A en suivant les instructions à la lettre. L'utilisation abusive ou inappropriée de Bicillin<sup>MD</sup> L-A peut favoriser la croissance de bactéries qui ne seront pas éliminées par Bicillin<sup>MD</sup> L-A (résistance), ce qui signifie que ce médicament pourrait ne pas fonctionner pour vous lors d'une utilisation ultérieure. Ne partagez jamais vos médicaments avec qui que ce soit.

### **Comment Bicillin<sup>MD</sup> L-A agit-il?**

Bicillin<sup>MD</sup> L-A est un antibiotique qui appartient à la classe des pénicillines. Il agit en tuant les bactéries qui causent votre infection ou en arrêtant leur multiplication.

### **Quels sont les ingrédients de Bicillin<sup>MD</sup> L-A?**

Ingrédient médicinal : pénicilline G benzathine

Ingrédients non médicinaux : lécithine, méthylparaben, polyvidone, propylparaben, carboxyméthylcellulose sodique, citrate de sodium, eau pour préparations injectables

### **Bicillin<sup>MD</sup> L-A se présente sous la ou les formes pharmaceutiques suivantes :**

Bicillin<sup>MD</sup> L-A se présente sous la forme d'une suspension (liquide) contenue dans une seringue jetable préremplie de 2 mL.

Une seringue préremplie de 2 mL contient 1 200 000 UI de pénicilline G benzathine.

### **Ne prenez pas Bicillin<sup>MD</sup> L-A si vous êtes allergique à :**

- la pénicilline G benzathine;
- un autre antibiotique pénicillinique du même groupe;
- ou à l'un des autres ingrédients de Bicillin<sup>MD</sup> L-A (*voir Mises en garde et précautions importantes et Quels sont les ingrédients de Bicillin<sup>MD</sup> L-A?*).

### **Consultez votre professionnel de la santé avant de recevoir Bicillin<sup>MD</sup> L-A, afin d'aider à éviter les effets secondaires et assurer la bonne utilisation du médicament. Informez votre professionnel de la santé de tous vos problèmes et états de santé, notamment si :**

- vous êtes allergique à d'autres antibiotiques pénicilliniques, à des céphalosporines comme, entre autres, la céfazoline ou la céphalexine, ou à tout autre médicament. Si vous ne savez pas si un médicament auquel vous êtes allergique appartient à l'un de ces groupes de médicaments, consultez un médecin;
- vous êtes atteint d'allergies à des aliments, des agents de conservation ou des colorants, du rhume des foins, d'urticaire ou d'asthme;
- vous avez des problèmes de rein;
- vous êtes enceinte ou planifiez une grossesse;
- vous allaitez ou avez l'intention d'allaiter; la pénicilline se retrouve dans le lait maternel.

## Autres mises en garde

Communiquez avec votre professionnel de la santé :

- Si vos symptômes ne s'améliorent pas ou s'aggravent pendant le traitement par Bicillin<sup>MD</sup> L-A.
- Si vous avez une éruption cutanée sévère ou des cloques sur la peau, avec ou sans fièvre.
- Si vous présentez un ou plusieurs des symptômes suivants pendant votre traitement ou plus de deux mois après votre traitement par Bicillin<sup>MD</sup> L-A : diarrhée sévère (selles liquides ou qui contiennent du sang) accompagnée ou non de fièvre ou de crampes d'estomac.

**Mentionnez à votre professionnel de la santé tous les médicaments et produits de santé que vous prenez, y compris : médicaments d'ordonnance et en vente libre, vitamines, minéraux, suppléments naturels et produits de médecine douce.**

**Les produits ci-dessous pourraient interagir avec Bicillin<sup>MD</sup> L-A :**

- la tétracycline (un antibiotique)
- le probénécide\* (pour le traitement de la goutte)

\* Produit non commercialisé au Canada.

## Comment Bicillin<sup>MD</sup> L-A s'administre-t-il?

Votre professionnel de la santé injectera Bicillin<sup>MD</sup> L-A dans un muscle de la fesse ou de la hanche. Chez les nourrissons et les enfants en bas âge, le professionnel de la santé pourrait injecter Bicillin<sup>MD</sup> L-A dans un muscle de la cuisse.

## Dose habituelle

La dose dépendra du type d'infection dont vous souffrez.

Votre professionnel de la santé calculera la dose qui vous convient.

Votre professionnel de la santé vous indiquera également pendant combien de temps vous devrez recevoir Bicillin<sup>MD</sup> L-A.

Si vous avez des questions sur le nombre de doses de Bicillin<sup>MD</sup> L-A vous devrez recevoir ou à quels moments vous devrez les recevoir, posez-les à votre professionnel de la santé.

## Surdose

Si vous pensez qu'une personne dont vous vous occupez ou que vous-même avez reçu une trop grande quantité de Bicillin<sup>MD</sup> L-A, communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même en l'absence de symptômes.

## Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à Bicillin<sup>MD</sup> L-A?

Lorsque vous prenez Bicillin<sup>MD</sup> L-A, vous pourriez présenter des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés ci-dessous. Si c'est le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Si vous prenez ce médicament contre la syphilis, des effets secondaires pourraient se manifester quelques heures après le début du traitement : fièvre, frissons, maux de tête, douleur aux muscles et réactions sur la peau (réaction de Jarisch-Herxheimer).

Autres effets secondaires possibles :

- Démangeaison
- Éruptions cutanées
- Fatigue générale
- Douleur
- Céphalées
- Nausées et vomissements
- Enflure des ganglions
- Douleur, inflammation, infection, saignement, ecchymose (bleu) dans la région où le médicament a été injecté
- Transpiration abondante
- Douleurs aux articulations et aux os
- Perte de masse musculaire
- Nervosité
- Tremblements involontaires
- Étourdissements
- Somnolence
- Confusion
- Perte de mémoire
- Anxiété
- Euphorie
- Tintement d'oreilles
- Modification du goût
- Difficulté à obtenir une érection ou un orgasme
- Érection persistante et douloureuse

Lorsqu'ils se manifestent, ces effets secondaires sont généralement mineurs et temporaires. Cependant, certains effets peuvent être plus graves et nécessiter une intervention médicale.

Effets secondaires graves et mesures à prendre			
Symptôme ou effet	Consultez votre professionnel de la santé.		Cessez de recevoir le médicament et obtenez immédiatement des soins médicaux
	Dans les cas sévères seulement	Dans tous les cas	
<b>FRÉQUENT</b>			
<b>Colite à <i>Clostridioides difficile</i> (inflammation de l'intestin) :</b> diarrhée sévère (selles très liquides ou qui contiennent du sang), accompagnée ou non de crampes d'estomac ou de fièvre			√

Effets secondaires graves et mesures à prendre			
Symptôme ou effet	Consultez votre professionnel de la santé.		Cessez de recevoir le médicament et obtenez immédiatement des soins médicaux
	Dans les cas sévères seulement	Dans tous les cas	
<b>RARE</b>			
<b>Réaction allergique sévère :</b> accompagnée de symptômes tels que : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Démangeaisons, rougeur de la peau</li> <li>• Desquamation généralisée, peau qui pèle</li> <li>• Plaques rouges et plates sur la peau</li> <li>• Sensation de brûlure ou de fourmillement sur la peau</li> <li>• Symptômes ressemblant à ceux de la grippe (frissons, fièvre, enflure, douleurs aux articulations, faiblesse, etc.)</li> <li>• Anaphylaxie (enflure du visage, des lèvres, de la langue ou du fond de la gorge, difficulté à avaler ou à respirer)</li> </ul>			√
<b>Problèmes cardiaques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Crise cardiaque</li> <li>• Battements cardiaques anormaux</li> <li>• Irrégularités du rythme cardiaque (palpitations)</li> <li>• Chute soudaine de pression et évanouissement</li> <li>• AVC</li> </ul>			√
<b>Problèmes pulmonaires :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pression du sang élevée dans les poumons</li> <li>• Caillots sanguins dans les poumons</li> <li>• Difficulté à respirer en période d'éveil ou durant le sommeil</li> </ul>			√

Effets secondaires graves et mesures à prendre			
Symptôme ou effet	Consultez votre professionnel de la santé.		Cessez de recevoir le médicament et obtenez immédiatement des soins médicaux
	Dans les cas sévères seulement	Dans tous les cas	
<b>Troubles nerveux et problèmes de circulation sanguine dans la région où le médicament a été injecté :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perte de sensibilité et de mouvement</li> <li>• Pâleur de la peau</li> <li>• Plaques sur la peau</li> <li>• Mort de la peau (ex. : gangrène) (les symptômes cutanés comprennent une coloration bleue ou noire, une douleur, un engourdissement, ou des plaies qui produisent un suintement malodorant)</li> <li>• Engourdissement dans un bras ou une jambe</li> <li>• Peau bleue ou noire sur un bras ou une jambe</li> </ul>			√
<b>Convulsions</b>			√
<b>Hallucinations :</b> (perceptions imaginaires qui peuvent être de nature visuelle, auditive, voire tactile)		√	
<b>Troubles sanguins :</b> <b>Anémie hémolytique</b> (une affection dans laquelle les globules rouges sont détruits et éliminés de la circulation avant le terme de leur vie normale) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Urine foncée</li> <li>• Fatigue</li> <li>• Teint pâle</li> <li>• Fréquence cardiaque accélérée</li> <li>• Essoufflement</li> <li>• Coloration jaunâtre de la peau et du blanc des yeux (jaunisse)</li> </ul> <b>Faible nombre de globules blancs</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fièvre</li> <li>• Infections fréquentes potentiellement graves</li> <li>• Affections pseudogrippales</li> </ul>		√	

Effets secondaires graves et mesures à prendre			
Symptôme ou effet	Consultez votre professionnel de la santé.		Cessez de recevoir le médicament et obtenez immédiatement des soins médicaux
	Dans les cas sévères seulement	Dans tous les cas	
<b>Faible nombre de plaquettes</b> (cellules dans le sang qui favorisent la coagulation du sang) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saignements anormaux</li> <li>• Saignements lors du brossage des dents</li> <li>• Tendance aux ecchymoses (bleus)</li> <li>• Petits points rouges sur la peau (pétéchies)</li> </ul>			
<b>Dégradation musculaire anormale</b> (rhabdomyolyse) : Parmi les symptômes, on compte : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Urine foncée ou de la couleur du cola</li> <li>• Douleur et faiblesse musculaires</li> </ul>		√	
<b>Problèmes de rein :</b> Parmi les symptômes, on compte : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toute modification de la quantité d'urine, de la couleur de l'urine ou de la fréquence des mictions (action d'uriner)</li> <li>• Accumulation de liquide</li> <li>• Perte de sommeil</li> <li>• Perte d'appétit</li> <li>• Maux d'estomac</li> <li>• Faiblesse</li> <li>• Difficultés de concentration</li> </ul>			√
<b>Modification de la vision :</b> Vision trouble		√	
Cécité			√
<b>Réactions indésirables cutanées sévères (SCAR)</b> (réactions cutanées sévères qui peuvent aussi toucher d'autres organes) : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desquamation (peau qui pèle), écailles ou formation de cloques (contenant ou non du pus) pouvant aussi toucher les yeux, la bouche, le nez ou les parties génitales; démangeaisons,</li> </ul>			√

Effets secondaires graves et mesures à prendre			
Symptôme ou effet	Consultez votre professionnel de la santé.		Cessez de recevoir le médicament et obtenez immédiatement des soins médicaux
	Dans les cas sévères seulement	Dans tous les cas	
éruption cutanée sévère, bosses sous la peau, douleur cutanée, coloration rouge, jaune ou violacée de la peau • Enflure et rougeur des yeux ou du visage • Symptômes ressemblant à ceux de la grippe, fièvre, frissons, courbatures, gonflement des glandes, toux • Essoufflement, douleur ou inconfort dans la poitrine			

Si vous présentez un symptôme ou un effet secondaire incommodant qui n'est pas mentionné ici ou qui s'aggrave au point de perturber vos activités quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

#### Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer à Santé Canada les effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation des produits de santé de l'une des deux façons suivantes :

- en consultant la page Web sur la déclaration des effets secondaires (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour savoir comment faire une déclaration en ligne, par courriel ou par télécopieur; ou
- en composant le numéro sans frais 1-866-234-2345.

*REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous souhaitez obtenir des renseignements sur la prise en charge des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.*

#### Conservation

Conserver le produit au réfrigérateur (entre 2 et 8 °C). Il peut être retiré du réfrigérateur et entreposé pendant 7 jours à une température ne dépassant pas 30 °C. Craint le gel.

Gardez ce médicament hors de la portée et de la vue des enfants.

#### Pour en savoir plus sur Bicillin<sup>MD</sup> L-A :

- Consultez votre professionnel de la santé.

- Consultez la monographie intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les Renseignements destinés aux patients. Ce document est disponible sur le site Web de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html>), le site Web du fabricant (<http://www.pfizer.ca>), ou peut être obtenu en composant le 1-800-463-6001.

Le présent feuillet a été rédigé par Pfizer Canada SRI.

Dernière révision : 18 avril 2023