Paxlovid™ Pfizer

AJA RÁPIDO!

O tratamento com PAXLOVID™ deve ser iniciado até o **5º dia de sintomas.**[1]

Bula de PAXLOVID™

ACESSE AQUI

Como tomar o PAXLOVID™ (nirmatrelvir + ritonavir)[1]

1 Tome a primeira dose de PAXLOVID™ pela manhã ou à noite, a depender de quando você obteve o produto.

2 Não mastigue, quebre ou esmague os comprimidos. Ingira os três comprimidos de uma vez (2 nirmatrelvir e 1 ritonavir), ou um em seguida do outro.

3 PAXLOVID™ pode ser ingerido com ou sem alimentos.

4 Tome sua segunda dose pela manhã ou à noite, a depender de quando você obteve o produto.

5 Faça o tratamento completo por cinco dias. Não pare de tomar PAXLOVID™ sem falar com seu médico, mesmo que se sinta melhor.

Fale com seu médico caso tenha alguma dúvida ou apresente qualquer sintoma antes, durante ou depois do tratamento de cinco dias.

Fale com seu médico se você não se sentir melhor ou se estiver pior depois dos cinco dias.

Importante!

Estas informações são para pacientes que recebem a dose padrão. **Se você tem doença renal, pode precisar de uma dose diferente.** Converse com seu médico e saiba mais abaixo sobre a dosagem para insuficiência renal.

Dosagem de PAXLOVID™

Pacientes tomam PAXLOVID™ por via oral, a cada 12 horas, durante cinco dias.[1]

DOSE MATINAL:

Dois comprimidos (cor rosa) de 150 mg de nirmatrelvir.

Um comprimido (cor branca) de 100 mg de ritonavir.

Os três comprimidos devem ser ingeridos ao mesmo tempo.

DOSE NOTURNA:

Dois comprimidos (cor rosa) de 150 mg de nirmatrelvir.

Um comprimido (cor branca) de 100 mg de ritonavir.

Os três comprimidos devem ser ingeridos ao mesmo tempo.

PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL MODERADA:[1]

Em pacientes com **insuficiência renal moderada**, a dose de PAXLOVID™ deve ser reduzida para nirmatrelvir/ritonavir 150mg/100mg (1 comprimido de cada) duas vezes ao dia por 5 dias.

O comprimido remanescente de nirmatrelvir deve ser dispensado de acordo com os requisitos locais. **Se o paciente tiver doença renal grave, não deve tomar PAXLOVID™.**

DOSE MATINAL:

Um comprimido (cor rosa) de 150 mg de nirmatrelvir.

Um comprimido (cor branca) de 100 mg de ritonavir.

Os dois comprimidos devem ser ingeridos ao mesmo tempo.

DOSE NOTURNA:

Um comprimido (cor rosa) de 150 mg de nirmatrelvir.

Um comprimido (cor branca) de 100 mg de ritonavir.

Os dois comprimidos devem ser ingeridos ao mesmo tempo.

Limitações de uso:[1]

PAXLOVID™ **não está autorizado** para início de tratamento em pacientes que requerem hospitalização devido à COVID-19 grave ou crítica.

PAXLOVID™ **não está autorizado** para profilaxia pré-exposição ou pós-exposição para prevenção de COVID-19.

PAXLOVID™ **não está autorizado** para uso por mais de 5 dias.

DÚVIDAS OU MAIS INFORMAÇÕES?

Entre em contato conosco

Ligue para
0800 016 625*

*Entre em contato com o **Fale Pfizer** de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados

FABI,
assistente virtual Pfizer

Fale com a Fabi e esclareça suas dúvidas a qualquer momento

FALAR COM A FABI

FALE CONOSCO PELO WHATSAPP
(11) 97948 6951*

*Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp de segunda a sexta-feira das 9h às 17h, exceto feriados

WHATSAPP

VISITE:
www.pfizermedicalinformation.com.br/pt-br/

Referência:

1. Bula do produto Paxlovid™ (nirmatrelvir + ritonavir). Disponível em: https://www.pfizer.com.br/bulas/paxlovid. Acesso em: 08 de novembro de 2024.

PP-C1D-BRA-0387 - NOVEMBRO 2024

Pfizer