

Navodilo za uporabo

Paxlovid 150 mg + 100 mg filmsko obložene tablete nirmatrelvir + ritonavir

▼ Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Tudi sami lahko k temu prispevate tako, da poročate o kateremkoli neželenem učinku zdravila, ki bi se utegnil pojaviti pri vas. Glejte na koncu poglavja 4, kako poročati o neželenih učinkih.

Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite katerikoli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katerekoli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Paxlovid in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Paxlovid
3. Kako jemati zdravilo Paxlovid
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Paxlovid
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Paxlovid in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Paxlovid vsebuje dve učinkovini, nirmatrelvir in ritonavir, v dveh različnih tabletah. Zdravilo Paxlovid je protivirusno zdravilo, ki ga uporabljamo za zdravljenje odraslih s COVID-19, ki ne potrebujejo dodatnega kisika in imajo povečano tveganje za napredovanje bolezni v hudo obliko.

COVID-19 povzroča virus, imenovan koronavirus. Zdravilo Paxlovid prepreči razmnoževanje virusa v celicah, to pa prepreči razmnoževanje virusa v telesu. To lahko vašemu telesu pomaga premagati okužbo z virusom in lahko prepreči pojav hude oblike bolezni.

Če se vaši simptomi poslabšajo ali ne izboljšajo po 5 dneh, se morate posvetovati z zdravnikom.

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Paxlovid

Ne jemljite zdravila Paxlovid

- če ste alergični na nirmatrelvir, ritonavir ali katerokoli sestavino zdravila Paxlovid (navedeno v poglavju 6);
- če jemljete katerokoli zdravilo, navedeno spodaj. Jemanje zdravila Paxlovid s temi zdravili lahko povzroči resne ali življenje ogrožajoče neželene učinke ali vpliva na delovanje zdravila Paxlovid:
 - alfuzosin (uprabljamo ga za zdravljenje simptomov povečane prostate);
 - ranolazin (uprabljamo ga za zdravljenje kronične bolečine v prsnem košu [angine pektoris]);
 - dronedaron, propafenon, kinidin (uprabljamo jih za zdravljenje bolezni srca in uravnavanje nerednega srčnega utripa);
 - rifampicin, rifapentin (uprabljamo ju za zdravljenje bakterijskih okužb);

- apalutamid, enzalutamid, neratinib, venetoklaks (uporabljamo jih za zdravljenje raka);
- karbamazepin, fenobarbital, fenitoin, primidon (uporabljamo jih za preprečevanje in nadzorovanje epileptičnih napadov);
- kolhicin (uporabljamo ga za zdravljenje putike);
- terfenadin (uporabljamo ga za zdravljenje alergij);
- kariprazin in lurasidon (uporabljamo ju za zdravljenje shizofrenije);
- pimozid, kvetiapin (uporabljamo ju za zdravljenje shizofrenije, bipolarni motnje, hude depresije in nenormalnih misli ali občutkov);
- silodozin (uporabljamo ga za zdravljenje povečane prostate);
- eplerenon in ivabradin (uporabljamo ju za zdravljenje težav s srcem in/ali krvnimi žilami);
- dihidroergotamin in ergotamin (uporabljamo ju za zdravljenje migrenskih glavobolov);
- ergonovin in metilergonovin (uporabljamo ju za zaustavljanje čezmerne krvavitve, ki se lahko pojavi po porodu ali splavu);
- cisaprid (uporabljamo ga za lajšanje določenih želodčnih težav);
- šentjanževka (*Hypericum perforatum*) (zdravilo rastlinskega izvora, ki ga uporabljamo pri depresiji in tesnobi);
- voklosporin (uporabljamo ga za zdravljenje bolezni imunskega sistema);
- lovastatin, simvastatin, lomitapid (uporabljamo jih za zniževanje holesterola v krvi);
- eletriptan (uporabljamo ga za zdravljenje migrenskih glavobolov);
- lumakaftor/ivakaftor (uporabljamo ga za zdravljenje cistične fibroze);
- finerenon (uporabljamo ga za zdravljenje kronične bolezni ledvic, povezane s sladkorno boleznijo tipa 2);
- naloksegol (uporabljamo ga za zdravljenje zaprtja, ki ga povzročajo opiodi);
- avanafil, vardenafil (uporabljamo ju za zdravljenje erektilne disfunkcije [znana tudi kot impotenca]);
- sildenafil, tadalafil (uporabljamo ju za zdravljenje erektilne disfunkcije [znana tudi kot impotenca] ali pljučne arterijske hipertenzije [visokega krvnega tlaka v pljučnih arterijah]);
- klorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, triazolam, midazolam, ki jih jemljemo peroralno (uporabljamo jih za zmanjšanje tesnobe in/ali težav s spanjem);
- tolvaptan, ki ga uporabljamo za zdravljenje hiponatriemije (nizkih ravni natrija v krvi).

Opozorila in previdnostni ukrepi

Alergijske reakcije

Pri osebah, ki jemljejo zdravilo Paxlovid, se lahko pojavijo alergijske reakcije, vključno s hudimi alergijskimi reakcijami (znanimi kot "anafilaksija") in resnima kožnima reakcijama (znanimi kot "toksična epidermalna nekroliza" in "Stevens-Johnsonov sindrom"), tudi po 1 samem odmerku. Če se pri vas pojavi katerikoli od naslednjih simptomov alergijske reakcije, nemudoma prenehajte jemati zdravilo Paxlovid in pokličite zdravnika:

- oteženo požiranje ali dihanje,
- otekanje jezika, ust in obraza,
- stiskanje v grlu,
- hripavost,
- srbenje,
- kožni izpuščaj,
- pordela in boleča koža,
- mehurji in luščenje kože,
- mehurji ali razjede v ustih ali na ustnicah.

Bolezen jeter

Obvestite zdravnika, če imate ali ste imeli bolezen jeter. Pri bolnikih, ki so prejeli ritonavir, so se pojavile nepravilnosti v delovanju jetrnih encimov, hepatitis in zlatenica.

Bolezen ledvic

Obvestite zdravnika, če imate ali ste imeli bolezen ledvic.

Visok krvni tlak

Obvestite zdravnika, če imate visok krvni tlak. Zdravnik bo morda moral preveriti vaš krvni tlak, preden boste začeli jemati zdravilo Paxlovid in tudi med jemanjem tega zdravila. Pri ljudeh, ki so jemali zdravilo Paxlovid, so poročali o visokem krvnem tlaku, zlasti pri starejših posameznikih.

Tveganje razvoja odpornosti HIV-1

Če imate nezdravljeno ali nenadzorovano okužbo s HIV, lahko zdravilo Paxlovid povzroči, da nekatera zdravila proti virusu HIV v prihodnosti ne bodo delovala tako dobro.

Otroci in mladostniki

Zdravila Paxlovid ne dajajte otrokom in mladostnikom, mlajšim od 18 let, saj zdravila Paxlovid pri otrocih in mladostnikih niso preučevali.

Druga zdravila in zdravilo Paxlovid

Obstajajo tudi druga zdravila, ki jih ne smemo jemati skupaj z zdravilom Paxlovid. Obvestite zdravnika(-e) ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katerokoli drugo zdravilo:

- zdravila, ki jih uporabljamo za zdravljenje raka, kot so afatinib, abemaciclib, ceritinib, dasatinib, enkorafenib, fostamatinib, ibrutinib, ivosidenib, nilotinib, vinblastin in vinkristin;
- zdravila, ki jih uporabljamo za redčenje krvi (antikoagulanti), kot so varfarin, rivaroksaban, dabigatran in apiksaban;
- zdravila, ki jih uporabljamo za zdravljenje epileptičnih krčev, kot sta divalproeks, lamotrigin in klonazepam;
- zdravila, ki jih uporabljamo za prenehanje kajenja, kot je bupropion;
- zdravila, ki jih uporabljamo za zdravljenje alergij, kot sta feksofenadin in loratadin;
- zdravila, ki jih uporabljamo za zdravljenje glivičnih okužb (antimikotiki), kot sta itrakonazol in vorikonazol;
- zdravila, ki jih uporabljamo za zdravljenje Cushingovega sindroma – pri katerem telo proizvaja preveč kortizola – kot so tablete ketokonazola;
- zdravila, ki jih uporabljamo za zdravljenje okužbe z virusom HIV, kot so efavirenz, maravirok, raltegravir, zidovudin in biktegravir/emtricitabin/tenofovir;
- zdravila, ki jih uporabljamo za zdravljenje okužb (npr. antibiotiki in protimikrobna zdravila), kot so atovakon, klaritromicin, eritromicin, fusidna kislina (ki jo jemljemo peroralno ali je dana intravensko), bedakilin, rifabutin, delamanid in sulfametoksazol/trimetoprim;
- zdravila, ki jih uporabljamo za zdravljenje shizofrenije in nenormalnih misli ali občutkov, kot je klozapin;
- zdravila, ki jih uporabljamo za zdravljenje duševnih motenj ali motenj razpoloženja, kot so haloperidol, risperidon in tioridazin;
- zdravila, ki jih uporabljamo za zdravljenje visokega krvnega tlaka v krvnih žilah, ki oskrbujejo pljuča, kot sta bosentan in riociguat;
- zdravila, ki jih uporabljamo za zdravljenje visokega krvnega tlaka (hipertenzije), kot so amlodipin, diltiazem, felodipin, lerkandipin, nikardipin, nifedipin in verapamil;
- zdravila, ki jih uporabljamo za zdravljenje težav s srcem in/ali krvnimi žilami, kot so aliskiren, ticagrelor, cilostazol in klopidogrel;
- zdravila, ki jih uporabljamo za zdravljenje bolezni srca in uravnavanje nerednega srčnega utripa, kot so digoksin, amjodaron, flekainid in dizopiramid;
- zdravila, ki jih uporabljamo za zdravljenje cistične fibroze, kot so ivakaftor, eleksakaftor/tezakaftor/ivakaftor in tezakaftor/ivakaftor;
- zdravila, ki jih uporabljamo za zdravljenje sladkorne bolezni, kot je saksagliptin;
- zdravila, ki jih uporabljamo za zdravljenje okužbe z virusom hepatitisa C, kot sta glekaprevir/pibrentasvir in sofosbuvir/velpatasvir/voksilaprevir;
- zdravila, ki jih uporabljamo za zniževanje holesterola v krvi, kot so atorvastatin, fluvastatin, pravastatin in rosuvastatin;
- zdravila, ki jih uporabljamo za zdravljenje migrenskih glavobolov, kot je rimegepant;
- zdravila, ki jih uporabljamo za zdravljenje urinske inkontinence, kot sta darifenacin in solifenacin;

- zdravila, ki jih uporabljamo za zdravljenje težav z duševnim zdravjem, kot sta aripiprazol in brekspiprazol;
- zdravila, ki jih uporabljamo za zaviranje imunskega sistema, kot so ciklosporin, everolimus, sirolimus in takrolimus;
- zdravila, ki jih uporabljamo za zdravljenje avtoimunskih bolezni, vključno z revmatoidnim artritisom, psoriatičnim artritisom ali ulceroznim kolitisom, kot sta tofacitinib in upadacitinib;
- zdravila, ki jih uporabljamo za zdravljenje hude bolečine, kot so morfin, fentanil, oksikodon, metadon, buprenorfin, druga morfinu podobna zdravila, petidin in piroksikam;
- zdravila, ki jih uporabljamo kot pomirjevala, hipnotike in uspavala, kot so alprazolam, buspiron in zolpidem;
- zdravila, ki jih uporabljamo za zdravljenje motnje pomanjkanja pozornosti ali motnje spanja, imenovane narkolepsija, kot so amfetamini;
- steroidi, vključno s kortikosteroidi, ki jih uporabljamo za zdravljenje vnetja, kot so budezonid, deksametazon, flutikazon, prednizolon in triamcinolon;
- zdravila, ki jih uporabljamo za zdravljenje astme in drugih težav, povezanih s pljuči, kot je kronična obstruktivna pljučna bolezen [KOPB], kot sta salmeterol in teofilin;
- zdravila, ki jih uporabljamo za zdravljenje depresije, kot so amitriptilin, fluoksetin, imipramin, nortriptilin, paroksetin in sertralin;
- zdravila, ki jih uporabljamo kot nadomestno zdravljenje s ščitničnimi hormoni, kot je levotiroksin;
- zdravila, ki jih uporabljamo za zdravljenje povečane prostate, kot je tamsulozin;
- katerokoli od naslednjih specifičnih zdravil:
 - peroralni kontraceptiv ali kontraceptiv v obliki obliža, ki vsebuje etinilestradiol in ki ga uporabljamo za preprečevanje zanositve;
 - midazolam v obliki injekcije (ki ga uporabljamo za sedacijo [budno, a zelo sproščeno stanje umirjenosti ali zaspanosti med medicinsko preiskavo ali posegom] ali anestezijo).

Veliko zdravil medsebojno deluje z zdravilom Paxlovid. **Pripravite seznam zdravil, ki jih uporabljate, da ga boste lahko pokazali zdravniku(-om) in farmacevtu.** Ne začnite jemati novega zdravila, ne da bi obvestili zdravnika(-e). Zdravnik(-i) vam lahko pove(-jo), ali je varno, da jemljete zdravilo Paxlovid z drugimi zdravili.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči, menite, da bi lahko bili noseči, ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom, preden vzamete to zdravilo.

Na voljo ni dovolj podatkov, da bi lahko bili prepričani, da je zdravilo Paxlovid varno za uporabo med nosečnostjo. Če ste noseči, uporaba zdravila Paxlovid ni priporočljiva, razen če vaše klinično stanje zahteva zdravljenje z zdravilom Paxlovid. Priporočljivo je, da med jemanjem zdravila Paxlovid in še 7 dni po zaključku zdravljenja z zdravilom Paxlovid iz previdnostnih razlogov nimate spolnih odnosov ali uporabljate kontracepcijo. Če jemljete hormonsko kontracepcijo, je priporočljiva uporaba kondoma ali druge nehormonske metode kontracepcije, ker lahko zdravilo Paxlovid zmanjša učinkovitost hormonske kontracepcije. Zdravnik vam bo svetoval o trajanju te potrebne prilagoditve vaših kontracepcijskih ukrepov.

Podatkov o uporabi zdravila Paxlovid med dojenjem ni. Med jemanjem zdravila Paxlovid in iz previdnostnih razlogov še 7 dni po zaključku zdravljenja z zdravilom Paxlovid ne smete dojeti svojega dojenčka.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Pričakovati je, da zdravilo Paxlovid ne bo imelo vpliva na sposobnost upravljanja vozil ali strojev.

Zdravilo Paxlovid vsebuje laktozo

Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev, se posvetujte z zdravnikom, preden vzamete to zdravilo.

Zdravilo Paxlovid vsebuje natrij

Tableti nirmatrelvirja in ritonavirja vsebujeta vsaka po manj kot 1 mmol (23 mg) natrija na odmerek, kar v bistvu pomeni 'brez natrija'.

3. Kako jemati zdravilo Paxlovid

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Zdravilo Paxlovid vsebuje 2 zdravili: nirmatrelvir in ritonavir. Priporočeni odmerek sta 2 tableti nirmatrelvirja (rožnata tableta) z 1 tableto ritonavirja (bela tableta), ki jih zaužijemo dvakrat na dan (zjutraj in zvečer).

Cikel zdravljenja traja 5 dni. Pri vsakem odmerku vzemite vse 3 tablete hkrati.

Če imate bolezen ledvic, se posvetujte z zdravnikom glede ustreznega odmerka zdravila Paxlovid.

Tablete pogoltnite cele. Tablet ne smete žvečiti, lomiti ali drobiti. Zdravilo Paxlovid lahko vzamete z obrokom ali brez njega.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Paxlovid, kot bi smeli

Če ste vzeli prevelik odmerek zdravila Paxlovid, takoj pokličite zdravnika ali obiščite urgentni oddelek najbližje bolnišnice.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Paxlovid

Če ste pozabili vzeti odmerek zdravila Paxlovid in od predvidenega časa jemanja še ni minilo 8 ur, ga vzemite takoj, ko se spomnite. Če odmerek zamudite za več kot 8 ur, preskočite zamujeni odmerek in vzemite naslednji odmerek ob vašem običajnem času jemanja. Ne vzemite 2 odmerkov zdravila Paxlovid hkrati.

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če ste prenehali jemati zdravilo Paxlovid

Tudi če se počutite bolje, ne prenehajte jemati zdravila Paxlovid, ne da bi se posvetovali z zdravnikom.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Pogosti: pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov

- driska
- bruhanje
- siljenje na bruhanje (navzea)
- spremenjen okus (kot so kovinski, grenak okus)
- glavobol

Občasni: pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov

- alergijske reakcije
- visok krvni tlak
- bolečina v trebuhu
- bolečina v mišicah
- kožni izpuščaj (poročan tudi kot del alergijske reakcije)

Redki: pojavijo se lahko pri največ 1 od 1000 bolnikov

- huda alergijska reakcija, znana kot "anafilaksija" (na primer otekanje jezika, ust in obraza, oteženo požiranje ali dihanje, stiskanje v grlu ali hripavost)
- resni kožni reakciji, znani kot "toksična epidermalna nekroliza" in "Stevens-Johnsonov sindrom" (na primer rdeča in boleča koža, mehurji in luščenje kože, mehurji ali razjede v ustih ali na ustnicah)
- splošno slabo počutje
- srbenje (poročan tudi kot del alergijske reakcije)

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite kateregakoli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)8 2000 500

Faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si

spletna stran: www.jazmp.si.

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Paxlovid

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli ali pretisnem omotu poleg oznake "EXP". Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Paxlovid

- Učinkovini v tem zdravilu sta nirmatrelvir in ritonavir.
 - Ena rožnata filmsko obložena tableta nirmatrelvirja vsebuje 150 mg nirmatrelvirja.
 - Ena bela filmsko obložena tableta ritonavirja vsebuje 100 mg ritonavirja.
- Druge sestavine v tableti nirmatrelvirja so mikrokristalna celuloza, laktoza monohidrat (glejte poglavje 2, "Zdravilo Paxlovid vsebuje laktozo"), premreženi natrijev karmelozat, koloidni silicijev dioksid in natrijev stearilfumarat (glejte poglavje 2, "Zdravilo Paxlovid vsebuje natrij"). Filmska obloga vsebuje hidroksipropilmetilcelulozo, titanov dioksid, makrogol/polietilenglikol in rdeč železov oksid.
- Druge sestavine v tableti ritonavirja so kopovidon, sorbitan lavrat, koloidni brezvodni silicijev dioksid, kalcijev hidrogenfosfat, natrijev stearilfumarat. Filmska obloga vsebuje hipromelozo, titanov dioksid, makrogol/polietilenglikol, hidroksipropilcelulozo, smukec, koloidni brezvodni silicijev dioksid in polisorbat 80.

Izgled zdravila Paxlovid in vsebina pakiranja

Filmsko obložene tablete zdravila Paxlovid so na voljo v 5 pretisnih oмотih z dnevnim odmerkom s skupno 30 tabletami, ki so pakirani v škatli.

En pretisni oмот z dnevnim odmerkom vsebuje 4 tablete nirmatrelvirja (po 150 mg) in 2 tableti ritonavirja (po 100 mg) ter ima označeno, katere tablete je treba vzeti zjutraj in katere zvečer (simbola sonca in lune).

150 mg filmsko obložene tablete nirmatrelvirja so rožnate, ovalne in imajo vtisnjeno oznako "PFE" na eni strani in "3CL" na drugi strani.

100 mg filmsko obložene tablete ritonavirja so bele do belkaste, v obliki kapsule in imajo vtisnjeno oznako "H" na eni strani in "R9" na drugi strani.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Pfizer Europe MA EEIG
Boulevard de la Plaine 17
1050 Bruxelles
Belgija

Proizvajalec

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH
Mooswaldallee 1
79108 Freiburg Im Breisgau
Nemčija

Pfizer Italia S.r.L.
Localita Marino del Tronto
63100 Ascoli, Piceno
Italija

Pfizer Ireland Pharmaceuticals
Little Connell
Newbridge
Irska

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na predstavništvo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom:

België/Belgique/Belgien
Luxembourg/Luxemburg
Pfizer NV/SA
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva
Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje
Tel: +370 5 251 4000

България
Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон
България
Тел.: +359 2 970 4333

Magyarország
Pfizer Kft.
Tel.: + 36 1 488 37 00

Česká republika
Pfizer, spol. s r.o.
Tel: +420 283 004 111

Malta
Vivian Corporation Ltd.
Tel: +356 21344610

Danmark

Pfizer ApS
Tlf: +45 44 20 11 00

Deutschland

PFIZER PHARMA GmbH
Tel: +49 (0)30 550055-51000

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal
Tel: +372 666 7500

Ελλάδα

Pfizer Ελλάς A.E.
Τηλ: +30 210 6785800

España

Pfizer, S.L.
Tel: +34 91 490 99 00

France

Pfizer
Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.
Tel: +385 1 3908 777

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland
Tel: 1800 633 363 (toll free)
+44 (0)1304 616161

Ísland

Icepharma hf.
Sími: +354 540 8000

Italia

Pfizer S.r.l.
Tel: +39 06 33 18 21

Κύπρος

Pfizer Ελλάς A.E. (Cyprus Branch)
Τηλ: +357 22817690

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā
Tel: + 371 670 35 775

Nederland

Pfizer bv
Tel: +31 (0)800 63 34 636

Norge

Pfizer AS
Tlf: +47 67 52 61 00

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H
Tel: +43 (0)1 521 15-0

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 335 61 00

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.
Tel: +351 21 423 5500

România

Pfizer Romania S.R.L
Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL
Pfizer, podružnica za svetovanje s področja
farmacevtske dejavnosti, Ljubljana
Tel: +386 (0)1 52 11 400

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL,
organizačná zložka
Tel: + 421 2 3355 5500

Suomi/Finland

Pfizer Oy
Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Sverige

Pfizer AB
Tel: +46 (0)8 550 520 00

United Kingdom (Northern Ireland)

Pfizer Limited
Tel: +44 (0) 1304 616161

Navodilo je bilo nazadnje revidirano 09/2024.

Za pridobitev navodila za uporabo v drugih jezikih skenirajte kodo z mobilno napravo.



URL: <https://pfi.sr/c19oralrx>

Drugi viri informacij

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila <https://www.ema.europa.eu>.

To navodilo za uporabo je na voljo v vseh uradnih jezikih EU/EGP na spletni strani Evropske agencije za zdravila.