

# להוציא את המיגרנה מהראש

הקריטריונים לרישום ODT Nurtec® בקופות השונות:

מכבי	כללית	מאוחדת	לאומית
תקרת שב"ן	תקרת שב"ן	תקרת שב"ן (מאוחדת שיא/עדיף)	תקרת שב"ן (מורחב)
רכישה דרך בית המרקחת של מכבי	רכישה דרך בית המרקחת של כללית	רכישה דרך בית המרקחת של מאוחדת	רכישה דרך בית המרקחת של לאומית
<b>לטיפול במיגרנה אקוטית - קבלת אריזה אחת (8 כדורים) למניעת מיגרנה אפיזודית - קבלת שתי אריזות (16 כדורים - תחת תקרת שב"ן אחת)</b>			
<b>טיפול במיגרנה אקוטית</b> יאוושר לאחר מיצוי של 2 טריפטנים כשלפחות אחד מהם נוסה בשנה האחרונה (אלא אם מדובר בתופעת לוואי שלא מאפשרת ניסיון חוזר) או אם קיימת התווית נגד לטריפטנים	<b>טיפול במיגרנה אקוטית</b> יאוושר לאחר מיצוי של 2 טריפטנים כדוגמת NSAIDs 2. טריפטנים (2 לפחות, כל אחד ל-3 התקפים במינימום) *מיצוי מוגדר כחוסר תגובה, התווית נגד או תופעות לוואי	<b>טיפול במיגרנה אקוטית</b> יאוושר לאחר מיצוי של 2 טריפטנים שחוו תופעות לוואי מטריפטנים ולכן לא יכולים לקבל מרשם לטריפטנים או אם קיימת התווית נגד לטריפטנים	<b>טיפול במיגרנה אקוטית</b> יאוושר לאחר מיצוי של 2 טריפטנים או אם קיימת התווית נגד לטריפטנים
<b>טיפול למניעת מיגרנה אפיזודית</b> יאוושר לאחר מיצוי של 2 קווי טיפול קודמים (ניסיון טיפולי ב-2 קבוצות פרמקולוגיות שונות)	<b>טיפול למניעת מיגרנה אפיזודית</b> יאוושר לאחר מיצוי של 3 קווי טיפול קודמים מתוך הקבוצות הבאות: 1. תרופות ללחץ דם 2. תרופות לאפילפסיה 3. תרופות לדיכאון 4. אחרים (בקלוסל, מגנזיום, הזרקות, דיקור) *מיצוי - התנסות של חודשיים לפחות בכל אחת	<b>טיפול למניעת מיגרנה אקוטית-מרשם מרופא משפחה או נירולוג</b> יאוושר לאחר מיצוי של 3 קווי טיפול קודמים (חוסמי בטא / טופיראמט / ולפיראט / נוגדי דיכאון - טריציקלים / וולאפאקסין / חוסמי תעלות סידן).	<b>טיפול למניעת מיגרנה אקוטית-מרשם מרופא משפחה או נירולוג</b> יאוושר לאחר מיצוי של 4 קווי טיפול קודמים למשך שלושה חודשים כל אחד
<b>מה נדרש לקבלת Nurtec ODT?</b> יש להגיש לאישור בקרת תרופות	<b>מה נדרש לקבלת Nurtec ODT?</b> יש להגיש לאישור בקרת תרופות	<b>מה נדרש לקבלת Nurtec ODT?</b> יש להגיש לאישור בקרת תרופות	<b>מה נדרש לקבלת Nurtec ODT?</b> יש להגיש לאישור בקרת תרופות

התרופה לא נכללת בסל השירותים לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי

# התרופה היחידה המאושרת גם לטיפול וגם למניעת מיגרנה\*, בכדור מסיס אחד<sup>1-3</sup>



כדור מתמוסס בעל התחלת פעולה מהירה<sup>#</sup>,  
המאפשר חזרה לתפקוד תוך 60 דקות<sup>4</sup>



יעילות מתמשכת עד 48 שעות, בכדור אחד<sup>4,5</sup>



הפחתה מובהקת של ממוצע ימי המיגרנה לעומת פלצבו<sup>5</sup>



פרופיל בטיחות וסבילות דומה לפלצבו במחקרים הקליניים<sup>4,5</sup>



ללא קונטראינדיציה עבור מטופלים עם רקע קרדיווסקולרי<sup>6,7</sup>



ללא עדות ל-MOH<sup>^</sup> במחקרים<sup>6</sup>



Nurtec<sup>®</sup> ODT הינה אנטגוניסט לקולטן של CGRP אשר מעורב בתהליך המיגרנה<sup>4</sup>

\* מניעת מיגרנה אפיזודית | # ביחס לפלצבו | <sup>^</sup>MOH - Medication Overuse Headache

**References:** 1. Nurtec latest approved prescribing information 2. Wilbanks et al. Migraine in Adult Primary Care, The Journal for Nurse Practitioners, Volume 18, Issue 4, 2022, Pages 366-369. 3. Baker et al. Human Milk and Plasma Pharmacokinetics of Single-Dose Rimegepant 75 mg in Healthy Lactating Women. Breastfeed Med. 2022 Mar;17(3):277-282. doi:10.1089/bfm.2021.0250. 4. Croop R et al. Lancet. 2019;394(10200):737-745. 5. Croop L et al. Lancet. doi:10.1016/S0140-6736(20)32544-7 [published online December 15, 2020]. 6. Ailani J et al. The American Headache Society Consensus Statement: Update on integrating new migraine treatments into clinical practice. Headache. 2021 Jul;61(7):1021-1039. doi: 10.1111/head.14153. 7. Eigenbrodt AK et al. Diagnosis and management of migraine in ten steps. Nat Rev Neurol. 2021 Aug;17(8):501-514. doi: 10.1038/s41582-021-00509-5.

**Nurtec ODT is an orally disintegrating tablet (contains 75 mg rimegepant), indicated for:** 1. Acute treatment of migraine with or without aura in adults 2. Preventive treatment of episodic migraine in adults. Contraindications Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients. Warnings, Precautions and Adverse reactions Hypersensitivity Reactions, including dyspnea and rash, have occurred with NURTEC ODT and can occur days after administration. If a hypersensitivity reaction occurs, discontinue NURTEC ODT and initiate appropriate therapy. Adverse Events: Acute Treatment of Migraine the most common adverse reaction was nausea (2%). Hypersensitivity occurred in less than 1% of patients. Preventive Treatment of Episodic Migraine the most common adverse reactions were nausea (2.7%) and abdominal pain/dyspepsia (2.4%). Drug Interactions: Avoid concomitant administration of Nurtec ODT with strong inhibitors of CYP3A4, strong or moderate inducers of CYP3A or potent inhibitors of P-gp or BCRP. Avoid another dose of Nurtec ODT within 48 hours when it is administered with moderate inhibitors of CYP3A4 Use in specific populations: Hepatic Impairment Avoid use of NURTEC ODT in patients with severe hepatic impairment. Renal Impairment Avoid use of NURTEC ODT in patients with end-stage renal disease (CLcr < 15 mL/min).

