

RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PATIENTS

LISEZ CE DOCUMENT POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

PrSULFATE D'ATROPINE INJECTABLE USP

Sulfate d'atropine

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à recevoir **Sulfate d'atropine injectable USP**. Ce feuillet est un résumé et il ne contient donc pas tous les renseignements pertinents au sujet de ce produit. Discutez avec votre professionnel de la santé de votre maladie et de votre traitement et demandez-lui si de nouveaux renseignements sur **Sulfate d'atropine injectable USP** sont disponibles.

Pourquoi utilise-t-on Sulfate d'atropine injectable USP?

Sulfate d'atropine injectable USP est utilisé chez les adultes et les enfants :

- avant une anesthésie, afin de ralentir la production de salive ou encore d'empêcher ou de réduire la production de sécrétions dans les poumons;
- pour rétablir la fréquence cardiaque et la pression du sang dans les artères durant une anesthésie;
- pour réduire les effets d'un bloc cardiaque parfois causé par les digitaliques;
- pour accélérer la fréquence cardiaque et prévenir l'évanouissement;
- comme antidote en cas de basse pression sévère causée par l'utilisation d'un médicament cholinergique;
- comme antidote contre les empoisonnements causés par les insecticides organophosphorés;
- comme antidote contre les empoisonnements causés par la muscarine que contiennent certains champignons, dont *Amanita muscaria*.

Comment Sulfate d'atropine injectable USP agit-il?

Sulfate d'atropine injectable USP agit en empêchant une substance chimique du corps (l'acétylcholine) de se lier à certains récepteurs présents sur les cellules nerveuses. Dans certains cas, il empêche également l'acétylcholine de surstimuler les cellules nerveuses et peut prévenir ou atténuer des symptômes tels que le bloc cardiaque et l'évanouissement.

Quels sont les ingrédients de Sulfate d'atropine injectable USP?

Ingrédient médicinal : sulfate d'atropine monohydraté

Ingrédients non médicinaux : chlorure de sodium, eau pour injection. Peut renfermer de l'hydroxyde de sodium et/ou de l'acide sulfurique pour l'ajustement du pH.

Sulfate d'atropine injectable USP se présente sous la forme pharmaceutique suivante :

Solution à 0,1 mg/mL

N'utilisez pas Sulfate d'atropine injectable USP dans les cas suivants :

- la pression dans vos yeux est élevée (glaucome);

- vous avez un problème médical caractérisé par l'épaississement de l'ouverture entre l'estomac et le petit intestin (sténose du pylore);
- votre prostate a augmenté de volume (hypertrophie de la prostate).

Consultez votre professionnel de la santé avant de recevoir Sulfate d'atropine injectable USP, afin d'aider à éviter les effets secondaires et assurer la bonne utilisation du médicament. Informez votre professionnel de la santé de tous vos problèmes et états de santé, y compris :

- si vous avez une maladie des poumons;
- si vous êtes enceinte, croyez l'être ou avez l'intention de le devenir.

Mentionnez à votre professionnel de la santé tous les médicaments et produits de santé que vous prenez, y compris : médicaments d'ordonnance et en vente libre, vitamines, minéraux, suppléments naturels et produits de médecine douce.

Les produits ci-dessous pourraient interagir avec Sulfate d'atropine injectable USP :

- Les médicaments appelés « antidépresseurs tricycliques » ou « inhibiteurs de la monoamine oxydase », utilisés dans le traitement de divers troubles (de l'humeur, anxieux, de la personnalité et neurologiques)
- Les antihistaminiques
- Les phénothiazines, utilisées dans le traitement de troubles mentaux et affectifs
- L'amantadine, utilisée dans le traitement de la maladie de Parkinson
- Les butyrophénones, utilisées pour traiter les troubles psychiatriques
- Le disopyramide et la mexilétine, utilisés pour traiter les anomalies du rythme cardiaque
- Le kétoconazole, un médicament antifongique

Comment Sulfate d'atropine injectable USP s'administre-t-il?

Sulfate d'atropine injectable USP vous sera administré par un professionnel de la santé dans un établissement de santé.

Dose habituelle

Votre dose sera déterminée par un professionnel de la santé.

Surdose

Si vous pensez qu'une personne dont vous vous occupez ou que vous-même avez reçu une trop grande quantité de Sulfate d'atropine injectable USP, communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même en l'absence de symptômes.

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à Sulfate d'atropine injectable USP?

Lorsque vous recevez Sulfate d'atropine injectable USP, vous pourriez présenter des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés ci-dessous. Si c'est le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé.

- Vision floue
- Constipation
- Difficulté à avaler
- Pupilles dilatées
- Sécheresse de la bouche
- Fréquence cardiaque rapide
- Fatigue
- Étourdissements
- Sentiment d'agitation
- Soif
- Manque de coordination ou d'équilibre
- Peau sèche et chaude
- Incapacité à transpirer
- Incapacité à uriner (rétention urinaire)
- Battements cardiaques accélérés et très forts (palpitations)
- Sensibilité à la chaleur et à la lumière
- Éruption cutanée
- Tremblements

Un professionnel de la santé vérifiera si vous présentez des effets secondaires lorsque vous recevrez Sulfate d'atropine injectable USP.

Si vous présentez un symptôme ou un effet secondaire incommode qui n'est pas mentionné ici ou qui s'aggrave au point de perturber vos activités quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer à Santé Canada les effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation des produits de santé de l'une des deux façons suivantes :

- en consultant la page Web sur la déclaration des effets secondaires (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour savoir comment faire une déclaration en ligne, par courriel ou par télécopieur; ou
- en composant le numéro sans frais 1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous souhaitez obtenir des renseignements sur la prise en charge des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

Conservation

Sulfate d'atropine injectable USP sera conservé par un professionnel de la santé à une température comprise entre 20 °C et 25 °C, à l'abri du gel et de la chaleur intense.

Gardez hors de la portée et de la vue des enfants.

Pour en savoir plus sur Sulfate d'atropine injectable USP :

- Communiquez avec votre professionnel de la santé.
- Consultez la monographie intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les Renseignements destinés aux patients. Ce document est disponible sur le site Web de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html>), le site Web du fabricant (<https://www.pfizer.ca>), ou peut être obtenu en composant le 1-800-463-6001.

Le présent feuillet a été rédigé par Pfizer Canada SRI.

Dernière révision : 26 octobre 2022