

Cibinqo (Abrocycynib) – KARTA PACJENTA

Imię i nazwisko pacjenta: _____

Imię i nazwisko lekarza (który przepisał Cibinqo): _____

Numer telefonu lekarza: _____

Data rozpoczęcia przyjmowania Cibinqo: _____

Informacje dla pacjentów dotyczące bezpieczeństwa stosowania leku Cibinqo

- Niniejsza karta zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które pacjent powinien wiedzieć przed rozpoczęciem leczenia lekiem Cibinqo oraz podczas terapii tym lekiem.
- Więcej informacji znajduje się w ulotce dla pacjenta dołączonej do opakowania leku Cibinqo.
- Jeśli którakolwiek z informacji jest niejasna, należy zapytać lekarza lub farmaceutę.

Kartę należy nosić przy sobie i pokazywać ją każdemu pracownikowi ochrony zdrowia zaangażowanemu w opiekę medyczną – na przykład farmaceutcie lub lekarzowi z oddziału ratunkowego.

Co to jest lek Cibinqo i w jakim celu się go stosuje

Lek Cibinqo zawiera substancję czynną abrocycynib i należy do grupy leków zwanych inhibitorami kinaz janusowych, które pomagają łagodzić stan zapalny. Działanie tego leku polega na zmniejszeniu aktywności w organizmie enzymu o nazwie „kinaza janusowa”, zaangażowanego w procesy zapalne.

Lek Cibinqo przeznaczony jest do stosowania w leczeniu pacjentów dorosłych oraz młodzieży w wieku 12 lat i starszej z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego, które jest znane także pod nazwą wyprysk atopowy. Lek Cibinqo uśmierza swędzenie i stany zapalne skóry poprzez zmniejszenie aktywności kinaz janusowych, co z kolei może łagodzić zaburzenia snu i inne następstwa atopowego zapalenia skóry, takie jak zaburzenia lękowe lub depresja oraz poprawia ogólną jakość życia.

Pacjent powinien wiedzieć o niektórych działaniach niepożądanych wymienionych poniżej i porozmawiać z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek działania niepożądane:

Ryzyko zakażeń

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cibinqo i w trakcie leczenia, należy omówić z lekarzem lub farmaceutą, jeśli u pacjenta:

- wystąpią objawy takie jak: gorączka, zranienia, uczucie zwiększonego zmęczenia lub problemy stomatologiczne, gdyż mogą to być objawy zakażenia.

Szczepienia

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceutcie, jeśli pacjent niedawno został poddany szczepieniu lub planuje szczepienie – gdyż stosowanie niektórych żywych szczepionek [np. szczepionki przeciw wirusom odry, świnki i różyczki (potrójna szczepionka MMR), szczepionki przeciw ospie wietrznej,

szczepionki przeciw rotawirusom] nie jest zalecane bezpośrednio przed oraz podczas leczenia lekiem Cibinqo.

Ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach lub płucach

Należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą, jeśli u pacjenta:

- wystąpi nagła duszność lub trudności w oddychaniu, ból w klatce piersiowej lub górnej części pleców, obrzęk nogi lub ręki, ból lub tkliwość nogi albo zaczerwienienie lub przebarwienie nogi lub ręki, ponieważ mogą to być objawy zakrzepów krwi w żyłach .

Ryzyko chorób serca

Należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą przed i w trakcie leczenia, jeśli u pacjenta:

- wystąpi silny ból lub uczucie ucisku w klatce piersiowej (które może rozprzestrzeniać się na ramiona, żuchwę, szyję i plecy), duszność, zimne poty, uczucie pustki w głowie lub nagłe zawroty głowy, ponieważ mogą to być objawy zawału serca.

Ryzyko raka

U pacjentów przyjmujących Cibinqo obserwowano przypadki niemelanocytowego nowotworu skóry. Lekarz może zalecić regularne badania skóry podczas przyjmowania leku Cibinqo. Jeśli w trakcie lub po zakończeniu terapii pojawią się nowe zmiany skórne albo zmieni się wygląd istniejących zmian, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Badania laboratoryjne

Lekarz może poprosić pacjenta o wykonanie badań laboratoryjnych (w tym badania poziomu cholesterolu) przed rozpoczęciem stosowania leku Cibinqo, a także podczas przyjmowania leku Cibinqo i może dostosować odpowiednio leczenie.

Antykoncepcja i ciąża

Leku Cibinqo NIE wolno stosować w ciąży.

Kobiety zdolne do zajścia w ciążę powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji podczas stosowania leku Cibinqo oraz przez co najmniej miesiąc po przyjęciu ostatniej dawki leku Cibinqo. Należy porozmawiać z lekarzem o odpowiednich metodach antykoncepcji.

Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka zajdzie w ciążę lub sądzi, że mogła zajść w ciążę podczas leczenia.