

RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PATIENTS

LISEZ CE DOCUMENT POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

CHLORURE DE CALCIUM INJECTABLE USP

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à recevoir **Chlorure de calcium injectable USP** et chaque fois que vous recevez une injection. Ce feuillet est un résumé et il ne contient donc pas tous les renseignements pertinents au sujet de ce produit. Discutez avec votre professionnel de la santé de votre maladie et de votre traitement et demandez-lui si de nouveaux renseignements sur **Chlorure de calcium injectable USP** sont disponibles.

Pourquoi utilise-t-on Chlorure de calcium injectable USP?

Chlorure de calcium injectable USP est utilisé chez les **adultes** :

- pour le traitement d'un faible taux de calcium dans le sang;
- pour le traitement de l'intoxication au magnésium due à un surdosage de sulfate de magnésium;
- pour le traitement d'un taux élevé de potassium dans le sang;
- dans le cadre d'une intervention de réanimation à la suite d'un arrêt cardiaque (lorsque le cœur reste faible à la suite d'une défibrillation ou que l'épinéphrine n'est pas efficace).

Comment Chlorure de calcium injectable USP agit-il?

Chlorure de calcium injectable USP agit en fournissant à votre organisme une quantité additionnelle de calcium et de minéraux de chlorure lorsqu'il y a un déséquilibre dans votre corps.

Quels sont les ingrédients de Chlorure de calcium injectable USP?

Ingrédient médicamenteux : chlorure de calcium dihydraté

Ingrédients non médicamenteux : acide chlorhydrique et/ou hydroxyde de sodium pour l'ajustement du pH, eau pour injection USP

Chlorure de calcium injectable USP se présente sous la forme pharmaceutique suivante :

Solution à 100 mg/mL, dans une seringue préremplie à usage unique

N'utilisez pas Chlorure de calcium injectable USP dans les cas suivants :

- si vous êtes allergique au chlorure de calcium ou à l'un des composants du produit;
- si vous souffrez de fibrillation ventriculaire (irrégularité dangereuse des battements du cœur);
- si vous présentez un risque d'intoxication digitalique;
- si vous êtes actuellement traité pour une asystole et une dissociation électromécanique;
- en injection dans les tissus corporels, car ce médicament est irritant pour les veines et cela pourrait provoquer une réaction grave de mort des tissus et de desquamation (peau qui pèle);
- si vous recevez actuellement des injections de ceftriaxone (un antibiotique).

Consultez votre professionnel de la santé avant de recevoir Chlorure de calcium injectable USP, afin d'aider à éviter les effets secondaires et assurer la bonne utilisation du médicament. Informez votre professionnel de la santé de tous vos problèmes et états de santé, notamment si :

- vous avez des problèmes rénaux;
- vous prenez ou vous avez pris récemment un digitalique ou une préparation semblable en raison de problèmes cardiaques;

- vous prenez un bloqueur des canaux calciques;
- vous êtes enceinte ou pensez l'être;
- vous allaitez.

Mentionnez à votre professionnel de la santé tous les médicaments et produits de santé que vous prenez, y compris : médicaments d'ordonnance et en vente libre, vitamines, minéraux, suppléments naturels et produits de médecine douce.

Les produits ci-dessous pourraient interagir avec Chlorure de calcium injectable USP :

- ceftriaxone (un antibiotique)
- digitaliques ou préparations semblables aux digitaliques pour le traitement de problèmes cardiaques
- médicaments appelés « bloqueurs des canaux calciques »

Comment Chlorure de calcium injectable USP s'administre-t-il?

- Chlorure de calcium injectable USP est administré par un professionnel de la santé dans un établissement de santé.
- Chlorure de calcium injectable USP est administré par une injection lente dans une veine.
- Si vous ressentez un inconfort pendant l'injection, dites-le à votre professionnel de la santé.

Dose habituelle

La dose de Chlorure de calcium injectable USP est déterminée par un professionnel de la santé.

Surdose

Comme l'injection est réalisée par un professionnel de la santé, il est peu probable que vous receviez une dose trop élevée. Toutefois, les symptômes d'un surdosage peuvent comprendre les suivants :

- Anorexie
- Nausées ou vomissements
- Constipation ou maux d'estomac
- Faiblesse musculaire
- Troubles mentaux
- Soif
- Besoin fréquent d'uriner
- Douleur aux os
- Calculs rénaux
- Battements cardiaques irréguliers
- Coma

Si vous pensez qu'une personne dont vous vous occupez ou que vous-même avez reçu une trop grande quantité de Chlorure de calcium injectable USP, communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même en l'absence de symptômes.

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à Chlorure de calcium injectable USP?

Lorsque vous recevez Chlorure de calcium injectable USP, vous pourriez ressentir des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés ci-dessous. Si c'est le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé.

- Goût de calcium dans la bouche
- Bouffées de chaleur
- Sensation de brûlure au point d'injection
- Baisse temporaire de la tension artérielle
- Sensation d'engourdissement ou de picotements

Si vous présentez un symptôme ou un effet secondaire inconfortable qui n'est pas mentionné ici ou qui s'aggrave au point de perturber vos activités quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer à Santé Canada les effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation des produits de santé de l'une des deux façons suivantes :

- en consultant la page Web sur la déclaration des effets secondaires (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour savoir comment faire une déclaration en ligne, par courrier ou par télécopieur; ou
- en composant le numéro sans frais 1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous souhaitez obtenir des renseignements sur la prise en charge des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

Conservation

Chlorure de calcium injectable USP est conservé par un professionnel de la santé à une température comprise entre 20 et 25 °C.

Gardez hors de la portée et de la vue des enfants.

Pour en savoir plus sur Chlorure de calcium injectable USP :

- Communiquez avec votre professionnel de la santé.
- Consultez la monographie intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les Renseignements destinés aux patients. Ce document est disponible sur le site Web de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html>), le site Web du fabricant [www.pfizer.ca], ou peut être obtenu en composant le 1-800-463-6001.

Le présent feuillet a été rédigé par Pfizer Canada SRI.

Dernière révision : 25 août 2022.