

דף מידע עבור מטופלים, הורים ומטפלים

אישור לשימוש חירום תחת תקנה 29 בפקסלוביד™ (PAXLOVID™) לטיפול במחלת קורונה (COVID-19) 2019

דף מידע זה מיועד לתת מידע לגבי אופן השימוש ואופן הפעולה של התכשיר. מדובר בתכשיר שאינו רשום בישראל, אשר אושר לטיפול בחולי קורונה קלים עד בינוניים בעלי גורמי סיכון, על ידי מנכ"ל משרד הבריאות, לפי תקנה 29 (א) לתקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986, ובהתאם להודעה בדבר הסכמת המנהל פי תקנות הרוקחים (תכשירים) (סעיף 9 לחלק ב בהודעה בדבר הסכמת המנהל "תכשיר המיועד לטיפול תרופתי להגנת תושבי המדינה במקרה של מחלה אפידמית או מידבקת").

1. מהו פקסלוביד?

פקסלוביד משמש לטיפול במחלת COVID-19 קלה עד בינונית במבוגרים ובילדים [בגיל 12 שנים ומעלה בעלי משקל 40 ק"ג לפחות] עם תוצאות חיוביות בבדיקת נגיף SARS-CoV-2 ישירה, ואשר מצויים בסיכון גבוה להידרדרות למחלת COVID-19 חמורה, לרבות אשפוז או מוות.

2. על מה עלי לדווח לרופא טרם נטילת פקסלוביד?

דווח לרופא אם:

- יש לך אלרגיות כלשהן
- יש לך מחלת כבד או כליות
- את בהיריון או מתכננת להרות
- את מניקה
- יש לך מחלות חמורות כלשהן


חלק מהתרופות עלולות לעבור אינטראקציה עם פקסלוביד ולגרום לתופעות לוואי חמורות. **דווח לרופא על כל התרופות שאתה נוטל**, לרבות תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם, ויטמינים ותוספי תזונה.

אל תתחיל ליטול **תרופה חדשה מבלי לדווח לרופא**. הרופא יכול לומר לך האם נטילת פקסלוביד עם תרופות אחרות היא בטוחה.

דווחי לרופא אם את נוטלת אמצעי מניעה הורמונלי משולב. פקסלוביד עשוי להשפיע על אופן הפעולה של גלולות למניעת היריון. נשים אשר יכולות להרות צריכות להשתמש באמצעי מניעה חלופי יעיל או באמצעי מניעה חסימתי נוסף למניעת היריון. שוחחי עם הרופא אם יש לך שאלות לגבי אמצעי מניעה העשויים להתאים לך.

3. כיצד עלי ליטול פקסלוביד?

- פקסלוביד מורכב מ- 2 תרופות: נירמטרלוויר וריטונווויר.
 - יש ליטול 2 טבליות נירמטרלוויר ורודות יחד עם טבליית ריטונווויר לבנה אחת דרך הפה פעמיים ביום מדי יום (בבוקר ובערב) במשך 5 ימים. **עבור כל מנה, יש ליטול את כל 3 הטבליות באותו מועד.**



אם יש לך מחלת כליות, שוחח עם הרופא. ייתכן כי אתה זקוק למינון שונה ומעקב צמוד.

- יש לבלוע את הטבליות בשלמותן. אין ללעוס, לחצות או לכתוש את הטבליות.
- ניתן ליטול פקסלוביד עם או ללא מזון.
- אין להפסיק את נטילת פקסלוביד מבלי לשוחח עם הרופא, גם אם חל שיפור בהרגשתך.
- אם החמצת מנת פקסלוביד בטווח של 8 שעות ממועד הנטילה הרגיל, עליך ליטול אותה מיד כשנזכרת. אם החמצת מנה וחלפו יותר מ-8 שעות, עליך לדלג על מנה זו וליטול את המנה הבאה במועד הרגיל. אין ליטול 2 מנות פקסלוביד בו זמנית.
- אם נטלת יותר מדי פקסלוביד, התקשר לרופא או פנה לחדר מיון בבית החולים הקרוב ביותר באופן מיידי.
- אם אתה נוטלת תרופה המכילה ריטונוויר או תרופה המכילה קוביציסטאט לטיפול בהפטיטיס C או בנגיף הכשל החיסוני האנושי (HIV), עליך להמשיך ליטול את התרופה כפי שנרשמה על ידי הרופא.

אין ליטול את התרופה יותר מ-5 ימים. שוחח עם הרופא אם הרגשתך אינה משתפרת לאחר 5 ימים.

4. מי אינו אמור ליטול פקסלוביד?

אין ליטול פקסלוביד:

- אם אתה אלרגי לנירמטרלוויר, לריטונוויר או לכל אחד המרכיבים הנוספים אשר מכילה פקסלוביד (ראה כמפורט בסעיף 8).
 - בשילוב עם תרופות מסוימות.
- נטילת פקסלוביד עם תרופות מסוימות עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות או מסכנות חיים או

להשפיע על אופן הפעולה של פקסלוביד. חשוב מאוד לדווח לרופא על כל התרופות ותוספי תזונה צמחיים שאתה נוטל מאחר שיייתכן כי אין לשלבם עם פקסלוביד.

חשוב מאוד לדווח לרופא על כל התרופות ותוספי התזונה הצמחיים שאתה נוטל מאחר ולפקסלוביד השפעות גומלין עם תרופות רבות. במקרים אלה הרופא יעץ שלא להשתמש בתכשיר או כי יש צורך בשינויים במינונים של התרופות הנוספות או במעקב מיוחד במהלך נטילת פקסלוביד. כמו כן, הרופא עשוי ליידע אותך לגבי תסמינים ספציפיים מהם יש להיזהר, אשר עשויים להעיד כי עליך להפסיק את הנטילה או להפחית את המינון של חלק מהתרופות הנוספות שלך.

5. מהן תופעות הלוואי האפשריות החשובות של פקסלוביד?

תופעות הלוואי האפשריות של פקסלוביד הן:

- **בעיות בכבד.** דווח לרופא מיד אם אתה סובל מהסימנים והתסמינים הבאים של בעיות בכבד: חוסר תיאבון, הצהבת העור והאזור הלבן של העיניים (צהבת), שתן בצבע כהה, צואה בצבע בהיר וגרד בעור, כאב באזור הקיבה (כאב בטן).
- **עמידות לתרופות לטיפול ב-HIV.** אם אתה סובל מזיהום ב-HIV שאינו מטופל, פקסלוביד עלול בעתיד להוביל לירידה ביעילותן של תרופות מסוימות לטיפול ב-HIV.

• תופעות לוואי אפשריות נוספות כוללות:

- שינוי בחוש הטעם
- שלשול
- לחץ דם גבוה
- כאבי שרירים

אם הופיעה/החמירה תופעת לוואי או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שאינה מופיעה בדף מידע זה, עליך להיוועץ ברופא.

6. מה אם אני בהיריון או מניקה?

אין ניסיון בטיפול בפקסלוביד בנשים הרות או מניקות. עבור אם ועובר, התועלת שבנטילת פקסלוביד עשויה לגבור על הסיכון הכרוך בטיפול. אם את בהיריון, שוחחי על האפשרויות שלך ומצבך הספציפי עם הרופא.

מומלץ כי תשתמשי באמצעי חסימתי יעיל למניעת היריון או שתימנעי מפעילות מינית במהלך נטילת פקסלוביד.

אם את מניקה, שוחחי על האפשרויות שלך ומצבך הספציפי עם הרופא.

7. כיצד עלי לדווח על תופעות לוואי של פקסלוביד?

יש לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

8. מידע נוסף:

נוסף על המרכיבים הפעילים התרופה מכילה גם:

טבליית נירמטרלווייר:

Colloidal silicon dioxide, croscarmellose sodium, lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, and sodium stearyl fumarate. The following are the ingredients in the film coating: hydroxy propyl methylcellulose, iron oxide red, polyethylene glycol, and titanium dioxide.

טבליית ריטונוויר:

Anhydrous dibasic calcium phosphate, colloidal silicon dioxide, copovidone, sodium stearyl fumarate, and sorbitan monolaurate. The following are the ingredients in the film coating: colloidal silicon dioxide, hydroxypropyl cellulose, hypromellose, polyethylene glycol 400, polyethylene glycol 3350, polysorbate 80, talc, and titanium dioxide.

9. כיצד עלי לאחסן פקסלוביד?

יש לאחסן טבליות פקסלוביד בטמפרטורת החדר בין 20°C ל-25°C. אם בתום הטיפול נותרה ברשותך תרופה, יש להחזיר לבית המרקחת להשמדה.

10. יבואן: פייזר פרמצבטיקה ישראל בע"מ, רח' שנקר 9, הרצליה פיתוח 46725.

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה דף מידע זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

אושר על ידי משרד הבריאות בינואר 2022

نشرة معلومات لمتلقي العلاج، الأهل ومقدمي العلاج

تصريح استخدام للطوارئ بموجب النظام رقم 29 لباكسلوفيد™ (PAXLOVID™) لعلاج مرض كورونا 2019 (COVID-19)

تهدف هذه النشرة لتقديم معلومات حول طريقة استخدام وطريقة عمل المستحضر. يدور الحديث عن مستحضر غير مسجل في إسرائيل، تمت المصادقة عليه لعلاج مرضى الكورونا المصابين بصورة طفيفة حتى متوسطة، أصحاب عوامل الخطورة، من قبل مدير عام وزارة الصحة، بموجب النظام رقم 29 (أ) من أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986، وبموجب الإخطار بشأن موافقة المدير بحسب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) (المادة 9 من القسم "ب" من الإخطار بشأن موافقة المدير "مستحضر مخصص للعلاج الطبي لحماية سكان الدولة في حالات المرض الوبائي أو المعدّي").

1. ما هو باكسلوفيد؟

يستخدم باكسلوفيد لعلاج مرض COVID-19 الطفيف حتى المتوسط لدى البالغين والأطفال [من عمر 12 عاماً وما فوق، ممن يبلغ وزنهم 40 كغم على الأقل] الذين تلقوا نتيجة إيجابية لفحص فيروس SARS-CoV-2 المباشر، والذين يتواجدون ضمن دائرة الخطورة الشديدة للتدهور إلى مرض COVID-19 خطير، وبضمن ذلك التسرير أو الوفاة.

2. ما الذي عليّ إبلاغ طبيبي به قبل أن تناول باكسلوفيد؟

أخبر الطبيب فوراً إذا:

- كان لديك أي نوع حساسية
- لديك مرض في الكبد أو الكلى
- كنت حاملاً أو تخططين للحمل
- كنت مرضعة
- كانت لديك أية أمراض خطيرة


قد تمرّ بعض الأدوية بتفاعلات مع باكسلوفيد وتسبب أعراضاً جانبية خطيرة. أبلغ الطبيب عن كل الأدوية التي تتناولها، وبضمن ذلك الأدوية بوصفة طبية والأدوية بدون وصفة طبية، الفيتامينات والمكملات الغذائية.

لا تبدأ بتناول دواء جديد دون إبلاغ الطبيب. يمكن للطبيب أن يقول لك إن كان تناول باكسلوفيد مع أدوية أخرى يعتبر آمناً.

أبلغني الطبيب إذا كنت تتناولين وسائل هرمونية مُدمجة لمنع الحمل. قد يؤثر باكسلوفيد على طريقة عمل حبوب منع الحمل. يجب على النساء القادرات على الحمل استعمال وسائل منع حمل بديلة ناجعة أو وسيلة منع حمل عازلة إضافية لمنع الحمل. تحدثني إلى الطبيب إذا كانت لديك أسئلة بشأن وسائل منع الحمل التي قد تكون مناسبة لك.

3. كيف يجب عليّ تناول باكسلوفيد؟

- يتألف باكسلوفيد من دوائين (2): نيرماترلفير وريتونافير.
 - يجب تناول قرصي (2) نيرماترلفير ورتونافير مع قرص ريتونافير أبيض واحد عن طريق الفم، مرتين في اليوم، كل يوم (صباحاً ومساءً) لمدة 5 أيام. بالنسبة لكل جرعة، يجب تناول الأقراص الـ 3 كلها في نفس الموعد.



○ إذا كان لديك مرض كلوي، فتحدث إلى الطبيب. قد تكون بحاجة لجرعة مختلفة ومتابعة لصيقة.

- يجب ابتلاع الأقراص كاملة. يُمنع مضغ، شطر أو سحق الأقراص.
- بالإمكان تناول باكسلوفيد مع أو بدون طعام.
- يُمنع التوقف عن تناول باكسلوفيد دون التحدث إلى الطبيب، حتى إذا شعرت بتحسن.
- إذا فوّت جرعة باكسلوفيد في نطاق 8 ساعات من موعد تناول المعتاد، عليك تناولها فور تذكرك لها. إذا فوّت جرعة ومرّت أكثر من 8 ساعات، عليك تجاوز هذه الجرعة وتناول الجرعة التالية في موعدها المعتاد. يُمنع تناول جرعتين من باكسلوفيد في نفس الوقت.
- إذا تناولت أكثر من اللازم من باكسلوفيد، اتصل بالطبيب أو توجّه فوراً لغرفة الطوارئ في أقرب مستشفى.
- إذا كنت تتناولين دواء يحتوي على ريتونافير أو دواء يحتوي على كوبيسيستات لعلاج التهاب الكبد الوبائي C أو فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة (HIV)، فعليك مواصلة تناول الدواء كما وصفه لك الطبيب.

يُمنع تناول الدواء لأكثر من 5 أيام. تحدث إلى الطبيب إذا لم تشعر بتحسن بعد 5 أيام.

4. من لا يجب أن يتناول باكسلوفيد؟

يُمنع تناول باكسلوفيد:

- إذا وجدت لديك حساسية (حساسا) لـ ريتونافير أو لأحد المركبات الإضافية التي يحتويها باكسلوفيد (انظر التفصيل في البند 8).

قد يؤدي تناول باكسلوفيد مع أدوية معينة إلى أعراض جانبية حادة أو خطيرة على الحياة أو أن يؤثر على طريقة عمل باكسلوفيد.

من المهم إبلاغ الطبيب عن أي دواء أو مكمل غذائي تتناوله لأنه قد لا يكون مسموحاً دمجها مع باكسلوفيد.

من المهم إبلاغ الطبيب عن أي دواء أو مكمل غذائي تتناوله لأن هنالك تأثيرات متبادلة لباكسلوفيد مع الكثير من الأدوية. في هذه الحالات، سينصحك الطبيب بعدم استخدام المستحضر أو أن هنالك حاجة لإجراء تغييرات في جرعات الأدوية الأخرى أو بمتابعة خاصة خلال تناول باكسلوفيد. كذلك، قد يبلغك الطبيب عن أعراض معينة عليك الحذر منها، والتي قد تدل على أن عليك التوقف عن تناول أو تقليل جرعة قسم من أدويةك الإضافية.

5. ما هي أعراض باكسلوفيد الجانبية الهامة الوارد حصولها؟

أعراض باكسلوفيد الجانبية الوارد حصولها هي:

- **مشاكل في الكبد.** أبلغ الطبيب إذا كنت تعاني من العلامات والأعراض التالية الخاصة بمشاكل الكبد: فقدان الشهية، اصفرار الجلد والمنطقة البيضاء من العينين (يرقان)، بول داكن اللون، براز فاتح اللون وحكة في الجلد، ألم في منطقة المعدة (ألم بطن).
- **مقاومة لأدوية لعلاج الـ HIV.** إذا كنت تعاني من عدوى HIV غير معالجة، فقد يؤدي باكسلوفيد مستقبلاً لانخفاض فاعلية بعض أدوية علاج الـ HIV .
- **تشمل الأعراض الجانبية الإضافية:**
 - تغييرات في حاسة الذوق
 - إسهال
 - ضغط دم مرتفع
 - آلام العضلات

إذا ظهر/ تفاقم عرض جانبي أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في نشرة المعلومات هذه، عليك استشارة الطبيب.

6. ماذا لو كنت حاملاً أو مرضعة؟

ليست هنالك خبرة في علاج النساء الحوامل أو المرضعات بواسطة باكسلوفيد. بالنسبة للأم والجنين، قد تكون الفائدة الكامنة في تناول باكسلوفيد أكبر من المخاطر المرتبطة بالعلاج. إذا كنت حاملاً، تحدثي مع الطبيب حول خيارتك ووضعك المحدد.

من المفضل أن تستعملي وسيلة عازلة ناجعة لمنع الحمل أو أن تمتنعي عن النشاط الجنسي خلال فترة تناول باكسلوفيد.

إذا كنت مرضعة، تحدثي مع الطبيب حول خيارتك ووضعك المحدد.

7. كيف يتم الإبلاغ عن أعراض باكسلوفيد الجانبية؟

يجب تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحولك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

8. معلومات إضافية:

بالإضافة إلى الموادّ الفعّالة، يحتوي الدواء أيضًا:

قرص نيرماتريلفير:

Colloidal silicon dioxide, croscarmellose sodium, lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, and sodium stearyl fumarate. The following are the ingredients in the film coating: hydroxy propyl methylcellulose, iron oxide red, polyethylene glycol, and titanium dioxide.

قرص ريتونافير:

Anhydrous dibasic calcium phosphate, colloidal silicon dioxide, copovidone, sodium stearyl fumarate, and sorbitan monolaurate. The following are the ingredients in the film coating: colloidal silicon dioxide, hydroxypropyl cellulose, hypromellose, polyethylene glycol 400, polyethylene glycol 3350, polysorbate 80, talc, and titanium dioxide.

9. كيف يجب عليّ تخزين باكسلوفيد؟

يجب حفظ أقراص باكسلوفيد في درجة حرارة الغرفة بين 20°C و 25°C . إذا تبقى لديك دواء بعد انتهاء العلاج، عليك إعادته للصيدلية للتخلص منه.

10. المستورد: فايزر لصناعة الأدوية إسرائيل م.ض.، شارع شنكار 9، هرتسليا بيتواح 46725.

لتبسيط قراءة نشرة المعلومات هذه وتسهيلها تمت صياغتها بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.

صادقت وزارة الصحة عليها في كانون الثاني 2022

INFORMATION LEAFLET FOR PATIENTS, PARENTS, AND CAREGIVERS

Emergency use authorization (EUA) of PAXLOVID™ under Regulation 29 for treatment of coronavirus disease 2019 (COVID-19)

This information leaflet is intended to provide information about the manner of use and manner of action of the medicinal product.

This is a non-registered medicinal product in Israel, which has been approved for treatment of mild-to-moderate COVID-19 patients with risk factors, by the Director General of the Ministry of Health, according to Regulation 29(A)9 of the Pharmacists' Regulations (Preparations) 1986, and in accordance with the notice on Director's agreement according to the Pharmacists' Regulations (Preparations) (Section 9 of Part B in the notice on Director's agreement "A medicinal product intended for medication therapy for protection of the country residents in case of an epidemic or a contagious disease").

1. What is PAXLOVID?

PAXLOVID is used to treat mild-to-moderate COVID-19 in adults and children [12 years of age and older weighing at least 40 kg] with positive results in direct SARS-CoV-2 viral testing, and who are at high risk for progression to severe COVID-19, including hospitalization or death.

2. What should I tell my doctor before taking PAXLOVID?

Tell your doctor if:

- You have any allergies
- You have a liver or kidney disease
- You are pregnant or plan to become pregnant
- You are breastfeeding
- You have any serious illnesses

Some medicines may interact with PAXLOVID and may cause serious side effects. **Tell your doctor about all the medicines you are taking**, including prescription and non-prescription medicines, vitamins and dietary supplements.


Do not start taking a **new medicine without telling your doctor**. Your doctor can tell you whether it is safe to take PAXLOVID with other medicines.

Tell your doctor if you are taking a combined hormonal contraceptive. PAXLOVID may affect how your birth control pills work. Women who are able to become pregnant should use another effective contraception form or an additional barrier method of contraception. Talk to your doctor if you have any questions about contraceptive methods that might be right for you.

3. How should I take PAXLOVID?

- PAXLOVID consists of 2 medicines: nirmatrelvir and ritonavir.

- Take 2 pink tablets of nirmatrelvir together with 1 white tablet of ritonavir by mouth 2 times each day (in the morning and in the evening) for 5 days. **For each dose, take all 3 tablets at the same time.**



- **If you have kidney disease, talk to your doctor. You may need a different dose and close follow up.**
- Swallow the tablets whole. Do not chew, break, or crush the tablets.
- PAXLOVID can be taken with or without food.
- Do not stop taking PAXLOVID without talking to your doctor, even if you feel better.
- If you miss a dose of PAXLOVID within 8 hours of the time it is usually taken, take it as soon as you remember. If you miss a dose by more than 8 hours, skip the missed dose and take the next dose at your regular time. Do not take 2 doses of PAXLOVID at the same time.
- If you take too much PAXLOVID, call your doctor or go to the nearest hospital emergency room immediately.
- If you are taking a ritonavir- or cobicistat-containing medicine to treat Hepatitis C or Human Immunodeficiency Virus (HIV), you should continue to take your medicine as prescribed by your doctor.

Do not take the medicine for a period longer than 5 days. Talk to your doctor if you do not feel better after 5 days.

4. Who should not take PAXLOVID?

Do not take PAXLOVID:

- If you are allergic to nirmatrelvir, ritonavir, or any of the other ingredients in PAXLOVID (see details in section 8).
- In combination with certain medicines.

Taking certain medicines with PAXLOVID may cause serious or life-threatening side effects or affect how PAXLOVID works. It is very important to tell your doctor about all the medicines and herbal supplements you are taking since they may not be combined with PAXLOVID.

It is very important to tell your doctor about all the medicines and herbal supplements you are taking since PAXLOVID may interact with other multiple medicines. In these cases, your doctor will advise you not to use the medicine or that there is a need to change the dose of your other medicines or that a special monitoring is needed while you are taking PAXLOVID. Your doctor may also tell you about specific symptoms to watch out for that may indicate that you need to stop or decrease the dose of some of your other medicines.

5. What are the important possible side effects of PAXLOVID?

Possible side effects of PAXLOVID are:

- **Liver problems.** Tell your doctor immediately if you have any of the following signs and symptoms of liver problems: loss of appetite, yellowing of the skin and white areas of the eyes (jaundice), dark colored urine, pale colored stool and itchy skin, pain in the stomach area (abdominal pain).
- **Resistance to HIV medicines.** If you have untreated HIV infection, PAXLOVID may lead to some HIV medicines not working as well in the future.
- **Additional possible side effects include:**
 - altered sense of taste
 - diarrhea
 - high blood pressure
 - muscle aches

If a side effect appears/worsens or if you experience any side not listed in this information leaflet, consult your doctor.

6. What if I am pregnant or breastfeeding?

There is no experience with treating pregnant or breastfeeding women with PAXLOVID. For a mother and unborn baby, the benefit of taking PAXLOVID may be greater than risk from the treatment. If you are pregnant, discuss your options and specific situation with your doctor.

It is recommended that you use effective barrier contraception or do not have sexual activity while taking PAXLOVID.

If you are breastfeeding, discuss your options and specific situation with your doctor.

7. How should I report side effects of PAXLOVID?

Side effects should be reported to the Ministry of Health by following the link 'Reporting Side Effects of Drug Treatment' on the Ministry of Health homepage (www.health.gov.il) which links to an online form for reporting side effects, or by using the following link: <https://sideeffects.health.gov.il>

8. Additional information:

In addition to the active ingredients, this medicine also contains:

Nirmatrelvir tablet:

Colloidal silicon dioxide, croscarmellose sodium, lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, and sodium stearyl fumarate. The following are the ingredients in the film coating: hydroxy propyl methylcellulose, iron oxide red, polyethylene glycol, and titanium dioxide.

Ritonavir tablet:

Anhydrous dibasic calcium phosphate, colloidal silicon dioxide, copovidone, sodium stearyl fumarate, and sorbitan monolaurate. The following are the ingredients in the film coating: colloidal silicon dioxide, hydroxypropyl cellulose, hypromellose, polyethylene glycol 400, polyethylene glycol 3350, polysorbate 80, talc, and titanium dioxide.

9. How should I store PAXLOVID?

Store PAXLOVID tablets at room temperature, between 20°C to 25°C.

If you have residual medicine at the end of treatment, return it to the pharmacy for destruction.

10. Importer: Pfizer Pharmaceuticals Israel Ltd., 9 Shenkar St, Herzliya Pituach 46725

Approved by the Ministry of Health in January 2022