



Nurtec[®] ODT
(rimegepant)
orally disintegrating tablets 75 mg

**הטיפול שלך
בנורטק™ או.די.טי (רימג'פנט)
להוציא את המיגרנה מהראש**



המידע מוגש בחסות פיזר פרמצבטיקה ישראל בע"מ

קיבלת חוברת זו מכיוון שהרופא רשם לך טיפול ב-Nurtec® ODT (Rimegepant), תרופה הנלקחת דרך הפה המסייעת בטיפול ובמניעה של התקפי מיגרנה.

החוברת מכילה מידע מועיל המשיב על שאלות נפוצות אודות הטיפול ב-Nurtec® ODT.

לשאלות נוספות ככל שנדרש יש לפנות לרופא.

- 4 מהי מיגרנה?
- 5 מהי Nurtec® ODT (Rimegepant)?
- 6 כיצד נוטלים Nurtec® ODT?
- 7 מה עליו לדעת לפני שאתחיל בטיפול?
- 8 מהן תופעות הלוואי האפשריות?
- 9 דף הערות
- 10 יומן מיגרנה

מהי מיגרנה?

מיגרנה הינה מחלה נויורולוגית שעלולה לגרום לכאב עז בצד אחד של הראש או בשני הצדדים.

זהו סוג של כאב ראש שיכול להופיע באופן חוזר, אך בשונה מכאבי ראש אחרים, תסמיני מיגרנה יכולים לכלול:

- הלמות או פעימות
- כאב ברקות או מאחורי עין או אוזן אחת
- רגישות לאור ולרעשים



1 מתוך 7
אנשים חווים מיגרנה



התקפי מיגרנה
נמשכים בדרך כלל
4 עד 72 שעות

כל אדם חווה מיגרנה בצורה שונה.

יש אנשים שסובלים מ-1 או 2 ימי מיגרנה בחודש, ואילו אחרים סובלים ממיגרנות 15 ימים או יותר בכל חודש.

יש שני סוגים עיקריים של התקפי מיגרנה: עם וללא אאורה.

במהלך שלב האאורה של התקף, ייתכנו הבזקי אור, ראיית כתמים שחורים, או תחושת עקצוץ בכפות הידיים או בפנים.

מהי Nurtec® ODT?

Nurtec® ODT היא תרופת מרשם הניתנת ככדור שמתמוסס במהירות, ומשמשת **גם לטיפול וגם למניעת מיגרנה** במבוגרים: היא יכולה לשמש לטיפול אקוטי בהתקפי מיגרנה (עם או ללא אאורה), ולטיפול מניעתי במיגרנה אפיזודית. Nurtec® ODT טרם נבדקה בילדים ומתבגרים.

טיפול אקוטי

במחקר קליני, אנשים שנטלו Nurtec® ODT לטיפול במיגרנה חשו הקלה בכאב ובתסמינים (רגישות לאור, רגישות רעשים, ו/או בחילה) בתוך 60 דקות. ההקלה נמשכה עד 48 שעות.

טיפול מניעתי

במחקר אחר, אנשים שנטלו Nurtec® ODT חוו פחות ימי מיגרנה חודשיים באופן משמעותי מאשר אנשים שנטלו פלצבו (טיפול דמה).

השפעה ממושכת
לאורך זמן



יכולה לטפל או למנוע מיגרנה עם יעילות מוכחת עד 48 שעות בכל נטילה

אפקט מהיר



יכולה לפעול במהירות לטיפול או למניעה של מיגרנה

מה עליי לדעת לפני שאתחיל בטיפול?

אין להשתמש ב-Nurtec® ODT אם יש לך אלרגיה לחומר הפעיל או לאחד מהמרכיבים האחרים של התרופה (יש לעיין בעלון המידע לצרכן).

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

תגובות אלרגיות - תגובות אלרגיות, כולל קשיי נשימה ופריחה, יכולות להתרחש לאחר נטילת התרופה.

זה יכול לקרות ימים לאחר נטילת התרופה. אם מתרחשת תגובה אלרגית, יש להפסיק את השימוש ולהתחיל טיפול מתאים.

לפני נטילת Nurtec® ODT, עליך ליידע את הרופא על כל בעיה רפואית, ובנוסף במצבים הבאים:

- יש לך בעיות בכבד
- יש לך בעיות בכליות
- את בהיריון או מתכננת להיכנס להיריון
- את מניקה או מתכננת להניק

יש ליידע את הרופא על כל התרופות שבשימושך, לרבות תרופות במרשם, תרופות שאינן במרשם, ויטמינים, או תוספים של צמחי מרפא

כיצד נוטלים Nurtec® ODT?

למניעת התקפי מיגרנה



נוטלים כדור מסיס אחד של 75 מ"ג אחת ליומיים להפחתת מספר התקפי המיגרנה בעתיד

לטיפול בהתקפי מיגרנה



נוטלים כדור מסיס אחד של 75 מ"ג לפי הצורך, לא יותר מפעם ביום, כדי להפסיק את כאב המיגרנה ותסמינים אחרים*

קל לקחת Nurtec® ODT




צא!

חוזרים לדברים החשובים בחיים.



הכן

מניחים כדור מסיס Nurtec® ODT מעל או מתחת ללשון. הכדור יתמוסס בתוך שניות, אין צורך לשתות מים.



היכון

מוציאים כדור מסיס Nurtec® ODT מהמגשית רק כשמוכנים ליטול אותו.

חשוב לזכור:

אין ליטול יותר מכדור מסיס אחד של 75 מ"ג בטווח של 24 שעות. יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.

* רגישות לאור, רגישות לרעשים, ו/או בחילה

הערות

דף זה מיועד עבורך – לכתוב הערות על הטיפול שלך, לתעד את המיגרנות שלך, או לכתוב שאלות שהיית רוצה לשאול את הרופא בביקור הבא.

מהן תופעות הלוואי האפשריות?

כמו בכל תרופה, השימוש ב-Nurtec® ODT טבליות מתמוססות בפה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל/י למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול/תסבלי מאף אחת מהן.

התרופה עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות כולל:

- תגובות אלרגיות. תגובות אלרגיות, כולל קשיי נשימה ופריחה, יכולות להתרחש לאחר נטילת התרופה. זה יכול לקרות ימים לאחר נטילת התרופה.
- יש לפנות מיד לרופא או לקבלת טיפול חירום רפואי אם מופיע אצלך אחד מהתסמינים הבאים, שיכולים להיות חלק מתגובה אלרגית:
 - נפיחות של הפנים, הפה, הלשון או הגרון
 - קשיי נשימה

תופעת הלוואי השכיחה ביותר של התרופה בטיפול אקוטי בהתקפי מיגרנה עם או ללא אאורה היא:

- בחילה
- תופעות הלוואי השכיחות ביותר של התרופה בטיפול מניעתי במיגרנה אפיזודית הן:
 - בחילה
 - כאב בטן
 - קשיי עיכול

ייתכנו תופעות לוואי נוספות.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר את/ה סובל/ת מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

לרשימת תופעות הלוואי המלאה יש לעיין בעלון לצרכן.

תאריך	משך ההתקף	סימפטומים מלווים / תחושות	תרופות שנטלתי ועזרו	תרופות שנטלתי ולא עזרו	טריגרים	רמת הכאב (1-10)	הערות

רמת הכאב שלי



1 אין כאב בכלל 2 כאב מועט 3 כאב בינוני 4 כאב חזק 5 כאב בלתי נסבל

סימפטומים לדוגמה:

- בחילה
- רגישות לאור
- רגישות לרעש

דוגמאות לטריגרים נפוצים למיגרנה:

- יין
- מזג אוויר
- גבינה צהובה
- אור
- חוסר שינה
- קפאין
- לחץ
- שוקולד
- ריחות
- רעש

תאריך	משך ההתקף	סימפטומים מלווים / תחושות	תרופות שנטלתי ועזרו	תרופות שנטלתי ולא עזרו	טריגרים	רמת הכאב (1-10)	הערות

רמת הכאב שלי



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

כאב בלתי נסבל כאב חזק כאב בינוני כאב מועט אין כאב בכלל

סימפטומים לדוגמה:

- בחילה
- רגישות לאור
- רגישות לרעש

דוגמאות לטריגרים נפוצים למיגרנה:

- יין
- מזג אוויר
- גבינה צהובה
- אור
- חוסר שינה
- קפאין
- לחץ
- שוקולד
- ריחות
- רעש

הערות	רמת הכאב (1-10)	טריגרים	תרופות שנטלתי ולא עזרו	תרופות שנטלתי ועזרו	סימפטומים מלווים/ תחושות	משך ההתקף	תאריך

רמת הכאב שלי



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 כאב בלתי נסבל כאב חזק כאב בינוני כאב מועט אין כאב בכלל

סימפטומים לדוגמה:

- בחילה
- רגישות לאור
- רגישות לרעש

דוגמאות לטריגרים נפוצים למיגרנה:

- יין
- מזג אוויר
- גבינה צהובה
- אור
- חוסר שינה
- קפאין
- לחץ
- שוקולד
- ריחות
- רעש

Nurtec[®] ODT
(rimegepant)
orally disintegrating tablets 75 mg

המידע נכון לתאריך: אפריל 2023

PP-NNT-ISR-0104

לעלון לצרכן סרקו



למידע נוסף
באתר מיגרנה סרקו



לדיווח תופעות לוואי: isr.aereporting@pfizer.com
לדיווח תופעות לוואי למשרד הבריאות: www.sideeffects.health.gov.il
לדיווח תלונות איכות: israelprodcomplaints@pfizer.com



פיזר פרמצבטיקה ישראל בע"מ

רח' שנקר 9, הרצליה פיתוח 4672509, טל': 09-970-0500, www.Pfizer.co.il

לשאלות נוספות ככל שנדרש ומידע נוסף יש לפנות לרופא/ה
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש