

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Креземба, 100 мг, капсулы.

2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Действующее вещество: изавуконазол.

Каждая капсула содержит 186.3 мг изавуконазония сульфата эквивалентно 100 мг изавуконазола.

Полный перечень вспомогательных веществ приведен в разделе 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Капсулы.

Твердые капсулы № 0e1 с крышечкой белого цвета с надписью черного цвета «С» и корпусом красновато-коричневого цвета с надписью черного цвета «100». Содержимое капсулы – от почти белого до желтого цвета порошок, допускается наличие конгломератов (комочков).

4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

4.1. Показания к применению

Препарат Креземба показан для лечения следующих заболеваний у взрослых старше 18 лет:

- инвазивный аспергиллез;
- мукомицоз у пациентов, для которых применение амфотерицина В неприемлемо (см. разделы 4.4 и 5.1).

Следует принимать во внимание официальные рекомендации по надлежащему применению противогрибковых средств.

4.2. Режим дозирования и способ применения

Режим дозирования

Ранняя таргетная терапия (превентивная терапия или терапия, обусловленная результатами диагностических исследований) может быть начата в ожидании подтверждения диагноза заболевания по результатам специфических диагностических тестов. Однако после

18.12.2023

получения этих результатов противогрибковую терапию следует скорректировать соответствующим образом.

Насыщающая доза

Рекомендуемая насыщающая доза — две капсулы (эквивалентно 200 мг изавуконазола) каждые 8 часов в течение первых 48 часов (всего 6 приемов).

Поддерживающая доза

Рекомендуемая поддерживающая доза — две капсулы (эквивалентно 200 мг изавуконазола) один раз в сутки, начиная через 12–24 часа после применения последней насыщающей дозы.

Длительность терапии должна быть определена клиническим ответом (см. раздел 5.1).

При длительном лечении более 6 месяцев следует тщательно оценить соотношение пользы и риска (см. разделы 5.1 и 5.3).

Переход на внутривенное применение

Также доступна форма выпуска препарата Креземба в виде лиофилизата для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, содержащего 200 мг изавуконазола.

Учитывая высокую биодоступность препарата при приеме внутрь (98 %; см. раздел 5.2), при наличии клинических показаний можно изменять способ применения препарата с внутривенного на пероральный и наоборот.

Особые группы пациентов

Пациенты пожилого возраста

Коррекция дозы у пациентов пожилого возраста не требуется, однако опыт клинического применения у таких пациентов ограничен.

Пациенты с нарушением функции почек

У пациентов с нарушением функции почек коррекция дозы препарата не требуется, включая пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности (см. раздел 5.2).

Пациенты с нарушением функции печени

У пациентов с легким и умеренным нарушением функции печени коррекция дозы не требуется (классы А и В по классификации Чайлд-Пью) (см. разделы 4.4 и 5.2).

Изавуконазол не изучался у пациентов с тяжелым нарушением функции печени (класс С по классификации Чайлд-Пью). Применение у таких пациентов не рекомендуется, за исключением случаев, когда ожидаемая польза превышает возможный риск (см. разделы 4.4, 4.8 и 5.2).

Дети

Безопасность и эффективность препарата Креземба у детей в возрасте от 0 до 18 лет на данный момент не установлены. Данные отсутствуют.

Способ применения

Капсулы Креземба можно принимать независимо от приема пищи.

Капсулы Креземба следует проглатывать целиком. Не следует жевать, раздавливать, растворять или открывать капсулы.

4.3. Противопоказания

Гиперчувствительность к изавуконазолу или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6.1.

Совместное применение с кетоконазолом (см. раздел 4.5).

Совместное применение с высокими дозами ритонавира (> 200 мг каждые 12 часов) (см. раздел 4.5).

Совместное применение с сильными индукторами CYP3A4/5, такими как рифампицин, рифабутин, карбамазепин, барбитураты длительного действия (например, фенобарбитал), фенитоин и препараты зверобоя или с умеренными индукторами CYP3A4/5, такими как эфавиренц, нафциллин и этравирин (см. раздел 4.5).

Пациенты с наследственным синдромом укороченного интервала QT (см. раздел 4.4).

4.4. Особые указания и меры предосторожности при применении

Гиперчувствительность

Следует с осторожностью назначать изавуконазол пациентам с гиперчувствительностью к другим противогрибковым средствам азольного ряда. Гиперчувствительность к изавуконазолу может привести к развитию нежелательных реакций, которые включают: гипотензию, дыхательную недостаточность, одышку, лекарственный дерматит, зуд и сыпь.

Тяжелые кожные нежелательные реакции

Сообщалось о тяжелых кожных нежелательных реакциях, таких как синдром Стивенса — Джонсона, в ходе терапии противогрибковыми средствами азольного ряда. Следует прекратить применение препарата Креземба в случае развития у пациента тяжелых кожных нежелательных реакций.

Сердечно-сосудистая система

Укорочение интервала QT

Изавуконазол противопоказан пациентам с наследственным синдромом укороченного интервала QT (см. раздел 4.3).

В ходе исследования по оценке влияния препарата на интервал QT у здоровых людей изавуконазол приводил к укорочению интервала QTс в зависимости от концентрации. Для режима дозирования 200 мг разница между средними значениями, рассчитанными методом наименьших квадратов (МНК), относительно плацебо составляла 13,1 мс через 2 часа после введения дозы (90 % ДИ: 17,1, 9,1 мс). При увеличении дозы до 600 мг разница МНК относительно плацебо составляла 24,6 мс через 2 часа после введения дозы (90 % ДИ: 28,7, 20,4 мс).

Необходимо проявлять осторожность при назначении изавуконазола пациентам, принимающим другие лекарственные препараты, которые приводят к укорочению интервала QT, например руфинамид.

Повышение уровня печеночных трансаминаз или гепатит

В клинических исследованиях были зарегистрированы случаи повышения уровней печеночных трансаминаз (см. раздел 4.8). Повышение уровней печеночных трансаминаз редко требует прекращения применения изавуконазола. При наличии клинических показаний следует проводить мониторинг уровня печеночных ферментов. Были зарегистрированы случаи гепатита при применении противогрибковых препаратов азольного ряда, включая изавуконазол.

Тяжелое нарушение функции печени

Изавуконазол не изучался у пациентов с тяжелым нарушением функции печени (класс C по классификации Чайлд-Пью). Применение у таких пациентов не рекомендуется, за исключением случаев, когда ожидаемая польза превышает возможный риск. Необходим тщательный контроль состояния таких пациентов на предмет возможной токсичности препарата (см. разделы 4.2, 4.8 и 5.2).

Совместное применение с другими лекарственными препаратами

Ингибиторы CYP3A4/5

Совместное применение с кетоконазолом противопоказано (см. раздел 4.3). В случае совместного применения с мощным ингибитором CYP3A4 лопинавиром/ритонавиром отмечено двукратное увеличение степени воздействия изавуконазола. В случае других мощных ингибиторов CYP3A4/5 можно ожидать менее выраженного эффекта. При совместном применении изавуконазола с мощными ингибиторами CYP3A4/5 коррекция дозы не требуется, однако рекомендуется проявлять осторожность по причине возможного увеличения частоты нежелательных лекарственных реакций (см. раздел 4.5).

Индукторы CYP3A4/5

Совместное применение со слабыми индукторами CYP3A4/5, такими как апрепитант, преднизон и пиоглитазон, может привести к легкому или умеренному уменьшению уровней изавуконазола в плазме; совместного применения со слабыми индукторами CYP3A4/5 следует избегать, за исключением случаев, когда ожидаемая польза превышает возможный риск (см. раздел 4.5).

Субстраты CYP3A4/5, включая иммунодепрессанты

Изавуконазол может рассматриваться в качестве умеренного ингибитора CYP3A4/5, и системное воздействие лекарственных препаратов, метаболизируемых CYP3A4, может увеличиваться при совместном применении с изавуконазолом. Совместное применение изавуконазола и субстратов CYP3A4, таких как иммунодепрессанты такролимус, сиролимус или циклоспорин, может увеличивать системное воздействие указанных лекарственных препаратов. При совместном применении может потребоваться осуществление соответствующего терапевтического лекарственного мониторинга и коррекция дозы (см. раздел 4.5).

Субстраты CYP2B6

Изавуконазол является индуктором CYP2B6. Системное воздействие лекарственных препаратов, метаболизируемых CYP2B6, может уменьшаться при совместном применении с изавуконазолом. Следовательно, рекомендуется соблюдать осторожность при совместном применении с изавуконазолом субстратов CYP2B6, особенно лекарственных препаратов с узким терапевтическим индексом, таких как циклофосфамид. Применение эфавиренза, субстрата CYP2B6, с изавуконазолом противопоказано, так как эфавиренз является умеренным индуктором CYP3A4/5 (см. раздел 4.3).

Субстраты P-gp

Изавуконазол может увеличивать степень воздействия лекарственных препаратов, являющихся субстратами P-gp. При совместном применении с изавуконазолом может потребоваться коррекция дозы лекарственных препаратов, являющихся субстратами P-gp, особенно лекарственных препаратов с узким терапевтическим индексом, таких как дигоксин, колхицин и дабигатрана этексилат (см. раздел 4.5).

Ограниченность клинических данных

Клинические данные о применении изавуконазола при лечении мукормикоза ограничены одним проспективным неконтролируемым клиническим исследованием у 37 пациентов с доказанным или вероятным мукормикозом, которые получали изавуконазол в качестве первичной терапии или по причине того, что применение других противогрибковых препаратов (преимущественно амфотерицина В) было неприемлемым.

Для отдельных видов *Mucorales* данные по клинической эффективности очень ограничены, зачастую одним или двумя пациентами (см. раздел 5.1). Данные о чувствительности доступны только в виде малой подгруппы случаев. Эти данные указывают на то, что концентрации изавуконазола, необходимые для ингибирования *in vitro*, очень различаются в зависимости от рода/вида в пределах разновидностей *Mucorales* и обычно выше, чем концентрации, необходимые для ингибирования видов *Aspergillus*. Следует отметить, что в случае мукормикоза не проводили исследование для определения дозы и пациентам вводили такую же дозу изавуконазола, которая использовалась для терапии инвазивного аспергиллеза.

4.5. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействия

Способность лекарственных препаратов влиять на фармакокинетику изавуконазола

Изавуконазол представляет собой субстрат CYP3A4 и CYP3A5 (см. раздел 5.2). Совместное применение лекарственных препаратов, которые являются ингибиторами CYP3A4 и/или CYP3A5, может приводить к увеличению концентрации изавуконазола в плазме. Совместное применение лекарственных препаратов, которые являются индукторами CYP3A4 и/или CYP3A5, может приводить к уменьшению концентрации изавуконазола в плазме.

Лекарственные препараты, которые ингибируют CYP3A4/5

Совместное применение изавуконазола и кетоконазола, мощного ингибитора CYP3A4/5, противопоказано, поскольку указанный лекарственный препарат способен приводить к значительному увеличению концентрации изавуконазола в плазме (см. разделы 4.3 и 4.5).

В случае совместного применения с мощным ингибитором CYP3A4 лопинавиром/ритонавиром отмечено двукратное увеличение степени воздействия

изавуконазола. В случае других мощных ингибиторов СYP3A4, например, кларитромицина, индинавира и саквинавира, исходя из их относительной активности, можно ожидать менее выраженного эффекта. При совместном применении изавуконазола с сильными ингибиторами СYP3A4/5 коррекция дозы не требуется, однако рекомендуется проявлять осторожность по причине возможного увеличения частоты нежелательных лекарственных реакций (см. раздел 4.4).

Коррекция дозы изавуконазола не требуется в случае одновременного применения со слабыми или умеренными ингибиторами СYP3A4/5.

Лекарственные препараты, которые индуцируют СYP3A4/5

Совместное применение изавуконазола с сильными индукторами СYP3A4/5, такими как рифампицин, рифабутин, карбамазепин, барбитураты длительного действия (например, фенобарбитал), фенитоин и препараты зверобоя, или с умеренными индукторами СYP3A4/5, такими как эфавиренз, нафциллин и этравирин, противопоказано, поскольку указанные лекарственные препараты способны приводить к значительному уменьшению концентрации изавуконазола в плазме (см. раздел 4.3).

Совместное применение изавуконазола со слабыми индукторами СYP3A4/5, такими как апрепитант, преднизон и пиоглитазон, может привести к легкому или умеренному уменьшению уровней изавуконазола в плазме; совместного применения со слабыми индукторами СYP3A4/5 следует избегать, за исключением случаев, когда ожидаемая польза превышает возможный риск (см. раздел 4.4).

Совместное применение изавуконазола с высокими дозами ритонавира (> 200 мг два раза в сутки) противопоказано, поскольку ритонавир в высоких дозах способен индуцировать СYP3A4/5 и приводить к уменьшению концентрации изавуконазола в плазме (см. раздел 4.3).

Способность изавуконазола влиять на воздействие других лекарственных средств

Лекарственные препараты, метаболизируемые СYP3A4/5

Изавуконазол является умеренным ингибитором СYP3A4/5; совместное применение изавуконазола с лекарственными препаратами, которые являются субстратами СYP3A4/5, может приводить к увеличению концентраций этих лекарственных препаратов в плазме.

Лекарственные препараты, метаболизируемые СYP2B6

Изавуконазол является слабым индуктором СYP2B6; совместное применение с препаратом изавуконазола может приводить к уменьшению концентраций субстратов СYP2B6 в плазме.

Лекарственные препараты, транспортируемые Р-gp в кишечнике

Изавуконазол является слабым ингибитором Р-гликопротеина (Р-gp); совместное применение с изавуконазолом может приводить к увеличению концентраций субстратов Р-gp в плазме.

Лекарственные препараты, транспортируемые BCRP

Изавуконазол является ингибитором BCRP *in vitro*, поэтому концентрации субстратов BCRP в плазме могут повышаться. Рекомендуется соблюдать осторожность при применении изавуконазола совместно с субстратами BCRP.

Лекарственные препараты, которые экскретируются почками посредством транспортных белков

Изавуконазол является слабым ингибитором переносчика органических катионов 2 (OCT2). Совместное применение изавуконазола и лекарственных препаратов, которые являются субстратами OCT2, может приводить к увеличению концентраций этих лекарственных препаратов в плазме.

Субстраты уридиндифосфатглюкуронилтрансфераз (УГТ)

Изавуконазол является слабым ингибитором УГТ. Совместное применение изавуконазола и лекарственных препаратов, которые являются субстратами УГТ, может приводить к небольшому увеличению концентраций этих лекарственных препаратов в плазме.

Таблица взаимодействия лекарственных средств

Взаимодействия между изавуконазолом и совместно применяемыми лекарственными препаратами в зависимости от их терапевтического класса приведены в таблице 1 (увеличение обозначено как ↑, а уменьшение как ↓). Если не указано иное, исследования, описанные в таблице 1, были проведены с использованием рекомендуемой дозы изавуконазола.

Таблица 1. Взаимодействия

Сопутствующие лекарственные препараты по терапевтической области	Влияние на концентрации препаратов/ среднее геометрическое изменение (%) AUC, C_{max} (механизм действия)	Рекомендации относительно совместного применения
<i>Противосудорожные средства</i>		
Карбамазепин, фенобарбитал и фенитоин (мощные индукторы CYP3A4/5)	Концентрация изавуконазола может уменьшаться (индуцирование CYP3A карбамазепином, фенитоином и барбитуратами длительного действия, например фенобарбиталом)	Совместное применение изавуконазола и карбамазепина, фенитоина и барбитуратов длительного действия, таких как фенобарбитал, противопоказано
<i>Антибактериальные средства</i>		
Рифампицин (мощный индуктор CYP3A4/5)	Изавуконазол AUC _{tau} : ↓ 90 % C _{max} : ↓ 75 % (индуцирование CYP3A4/5)	Совместное применение изавуконазола и рифампицина противопоказано
Рифабутин (мощный индуктор CYP3A4/5)	Не изучалось.	Совместное применение изавуконазола и рифабутина противопоказано

	Концентрации изавуконазола могут значительно уменьшаться (индуцирование CYP3A4/5)	
Нафциллин (умеренный индуктор CYP3A4/5)	Не изучалось. Концентрации изавуконазола могут значительно уменьшаться (индуцирование CYP3A4/5)	Совместное применение изавуконазола и нафциллина противопоказано
Кларитромицин (мощный ингибитор CYP3A4/5)	Не изучалось. Концентрации изавуконазола могут увеличиваться (ингибирование CYP3A4/5)	Коррекция дозы изавуконазола не требуется; рекомендуется проявлять осторожность по причине возможного увеличения частоты нежелательных реакций.
<i>Противогрибковые средства</i>		
Кетоконазол (мощный ингибитор CYP3A4/5)	Изавуконазол AUC _{tau} : ↑ 422 % C _{max} : ↑ 9 % (ингибирование CYP3A4/5)	Совместное применение изавуконазола и кетоконазола противопоказано
<i>Препараты растительного происхождения</i>		
Препараты зверобоя (мощный индуктор CYP3A4/5)	Не изучалось. Концентрации изавуконазола могут значительно уменьшаться (индуцирование CYP3A4)	Совместное применение изавуконазола и препаратов зверобоя противопоказано
<i>Иммунодепрессанты</i>		
Циклоспорин, сиролимус, такролимус (субстраты CYP3A4/5)	Циклоспорин AUC _{inf} : ↑ 29 % C _{max} : ↑ 6 % Сиролимус AUC _{inf} : ↑ 84 % C _{max} : ↑ 65 % Такролимус AUC _{inf} : ↑ 125 % C _{max} : ↑ 42 % (ингибирование CYP3A4)	Коррекция дозы изавуконазола не требуется. Циклоспорин, сиролимус, такролимус: мониторинг уровней в плазме и при необходимости — соответствующая коррекция дозы
Микофенолата мофетил (МФМ) (субстрат UGT)	Микофеноловая кислота (МФК, активный метаболит) AUC _{inf} : ↑ 35 %	Коррекция дозы изавуконазола не требуется.

	<p>C_{max}: ↓ 11 %</p> <p>(ингибирование UGT)</p>	МФМ: рекомендуется мониторинг вызываемых МФК токсических реакций
Преднизон (субстрат CYP3A4)	<p>Преднизолон (активный метаболит)</p> <p>AUC_{inf}: ↑ 8 %</p> <p>C_{max}: ↓ 4 %</p> <p>(ингибирование CYP3A4).</p> <p>Концентрации изавуконазола могут уменьшаться</p> <p>(индуцирование CYP3A4/5)</p>	Совместного применения следует избегать, за исключением тех случаев, когда ожидаемая польза превышает возможный риск
Опиоиды		
Опиаты короткого действия (алфентанил, фентанил) (субстрат CYP3A4/5)	<p>Не изучалось.</p> <p>Концентрации опиатов короткого действия могут увеличиваться</p> <p>(ингибирование CYP3A4/5)</p>	Коррекция дозы изавуконазола не требуется. Опиаты короткого действия (алфентанил, фентанил): тщательное наблюдение с целью выявления признаков лекарственной токсичности и при необходимости — уменьшение дозы
Метадон (субстрат CYP3A4/5, 2B6 и 2C9)	<p>S-метадон (неактивный опиатный изомер)</p> <p>AUC_{inf}: ↓ 35 %</p> <p>C_{max}: ↑ 1 %</p> <p>40 % уменьшения периода конечного полувыведения.</p> <p>R-метадон (активный опиатный изомер)</p> <p>AUC_{inf}: ↓ 10 %</p> <p>C_{max}: ↑ 4 %</p> <p>(индуцирование CYP2B6)</p>	Коррекция дозы изавуконазола не требуется. Метадон: коррекция дозы не требуется
Противоопухолевые средства		
Алкалоиды барвинка (винкристин, винбластин) (субстраты P-gp)	<p>Не изучалось.</p> <p>Концентрации алкалоидов барвинка могут увеличиваться</p> <p>(ингибирование P-gp)</p>	Коррекция дозы изавуконазола не требуется. Алкалоиды барвинка: тщательное наблюдение с целью выявления признаков лекарственной токсичности и при необходимости — уменьшение дозы
Циклофосфамид (субстрат CYP2B6)	<p>Не изучалось.</p> <p>Концентрации циклофосфамида могут уменьшаться</p>	Коррекция дозы изавуконазола не требуется. Циклофосфамид: тщательное наблюдение с

	(индуцирование CYP2B6)	целью выявления отсутствия эффективности препарата и при необходимости — увеличение дозы
Метотрексат (субстрат BCRP, OAT1, OAT3)	Метотрексат AUC _{inf} : ↓ 3 % C _{max} : ↓ 11 % 7-гидроксиметаболит AUC _{inf} : ↑ 29 % C _{max} : ↑ 15 % (механизм неизвестен).	Коррекция дозы изавуконазола не требуется. Метотрексат: коррекция дозы не требуется
Другие противоопухолевые средства (даунорубицин, доксорубицин, иматиниб, иринотекан, лапатиниб, митоксантрон, топотекан) (субстраты BCRP)	Не изучалось. Концентрации даунорубицина, доксорубицина, иматиниба, иринотекана, лапатиниба, митоксантрона, топотекана могут увеличиваться (ингибирование BCRP)	Коррекция дозы изавуконазола не требуется. Даунорубицин, доксорубицин, иматиниб, иринотекан, лапатиниб, митоксантрон или топотекан: тщательное наблюдение с целью выявления признаков лекарственной токсичности и при необходимости — уменьшение дозы
Противорвотные препараты		
Апрепитант (слабый индуктор CYP3A4/5)	Не изучалось. Концентрации изавуконазола могут уменьшаться (индуцирование CYP3A4/5)	Совместного применения следует избегать, за исключением тех случаев, когда ожидаемая польза превышает возможный риск
Противодиабетические средства		
Метформин (субстрат OCT1, OCT2 и MATE1)	Метформин AUC _{inf} : ↑ 52 % C _{max} : ↑ 23 % (ингибирование OCT2)	Коррекция дозы изавуконазола не требуется. Метформин: может потребоваться уменьшение дозы
Репаглинид (субстрат CYP2C8 и OATP1B1)	Репаглинид AUC _{inf} : ↓ 8 % C _{max} : ↓ 14 %	Коррекция дозы изавуконазола не требуется. Репаглинид: коррекция дозы препарата не требуется
Антикоагулянты		
Дабигатрана этексилат (субстрат P-gp)	Не изучалось. Концентрации дабигатрана этексилата могут увеличиваться (ингибирование P-gp)	Коррекция дозы изавуконазола не требуется. Дабигатрана этексилат характеризуется узким терапевтическим индексом, следует проводить мониторинг и при

		необходимости – уменьшение дозы
Варфарин (субстрат CYP2C9)	S-варфарин AUC _{inf} : ↑ 11 % C _{max} : ↓ 12 % R-варфарин AUC _{inf} : ↑ 20 % C _{max} : ↓ 7 %	Коррекция дозы изавуконазола не требуется. Варфарин: коррекция дозы не требуется
Антиретровирусные средства		
Лопинавир 400 мг/ритонавир 100 мг (мощные ингибиторы и субстраты CYP3A4/5)	Лопинавир AUC _{tau} : ↓ 27 % C _{max} : ↓ 23 % C _{min} , ss: ↓ 16 % ^a . Ритонавир AUC _{tau} : ↓ 31 % C _{max} : ↓ 33 % (механизм неизвестен). Изавуконазол AUC _{tau} : ↑ 96 % C _{max} : ↑ 74 % (ингибирование CYP3A4/5)	Коррекция дозы изавуконазола не требуется; рекомендуется проявлять осторожность по причине возможного увеличения частоты нежелательных лекарственных реакций. Лопинавир/ритонавир: коррекция дозы при приеме лопинавира 400 мг/ритонавира 100 мг каждые 12 часов не требуется, необходимо тщательное наблюдение с целью выявления отсутствия антиретровирусной эффективности препарата
Ритонавир (в дозах > 200 мг каждые 12 часов) (мощный индуктор CYP3A4/5)	Не изучалось. Ритонавир в высоких дозах может вызывать значительное уменьшение концентраций изавуконазола (индуцирование CYP3A4/5)	Совместное применение изавуконазола и ритонавира в высоких дозах (> 200 мг каждые 12 часов) противопоказано
Эфавиренз (умеренный индуктор CYP3A4/5 и субстрат CYP2B6)	Не изучалось. Концентрации эфавиренза могут уменьшаться (индуцирование CYP2B6) Концентрации изавуконазола могут значительно уменьшаться (индуцирование CYP3A4/5)	Совместное применение изавуконазола и эфавиренза противопоказано.
Этравирин (умеренный индуктор CYP3A4/5)	Не изучалось. Концентрации изавуконазола	Совместное применение изавуконазола и этравирина противопоказано

	могут значительно уменьшаться (индуцирование CYP3A4/5)	
Индинавир (мощный ингибитор и субстрат CYP3A4/5)	Индинавир ^b AUC _{inf} : ↓ 36 % C _{max} : ↓ 52 % (механизм неизвестен). Концентрации изавуконазола могут увеличиваться (ингибирование CYP3A4/5)	Коррекция дозы изавуконазола не требуется; рекомендуется проявлять осторожность по причине возможного увеличения частоты нежелательных лекарственных реакций. Индинавир: тщательное наблюдение с целью выявления отсутствия антиретровирусной эффективности препарата и при необходимости — увеличение дозы
Саквинавир (мощный ингибитор CYP3A4)	Не изучалось. Концентрации саквинавира могут уменьшаться (как это обнаружено для лопинавира/ритонавира) или увеличиваться (ингибирование CYP3A4). Концентрации изавуконазола могут увеличиваться (ингибирование CYP3A4/5).	Коррекция дозы изавуконазола не требуется; рекомендуется проявлять осторожность по причине возможного увеличения частоты нежелательных лекарственных реакций. Саквинавир: тщательное наблюдение с целью выявления признаков лекарственной токсичности и/или отсутствия антиретровирусной эффективности препарата и при необходимости — коррекция дозы
Другие ингибиторы протеаз (например, фосампренавир) (мощные или умеренные ингибиторы и субстраты CYP3A4/5)	Не изучалось. Концентрации ингибиторов протеаз могут уменьшаться (как это обнаружено для лопинавира/ритонавира) или увеличиваться (ингибирование CYP3A4) Концентрации изавуконазола могут увеличиваться (ингибирование CYP3A4/5)	Коррекция дозы изавуконазола не требуется. Ингибиторы протеаз: тщательное наблюдение с целью выявления признаков лекарственной токсичности и/или отсутствия антиретровирусной эффективности препарата и при необходимости — коррекция дозы
Другие ННИОТ (например, невирапин)	Не изучалось.	Коррекция дозы изавуконазола не требуется.

(индукторы и субстраты CYP3A4/5 и 2B6)	Концентрации ННИОТ могут уменьшаться (индуцирование CYP2B6 изавуконазолом) или увеличиваться (ингибирование CYP3A4/5)	ННИОТ: тщательное наблюдение с целью выявления признаков лекарственной токсичности и/или отсутствия антиретровирусной эффективности препарата и при необходимости — коррекция дозы
Препараты, снижающие продукцию соляной кислоты		
Эзомепразол (субстрат CYP2C19, ↑ pH желудочного сока)	Изавуконазол AUC _{tau} : ↑ 8 % C _{max} : ↑ 5 %	Коррекция дозы изавуконазола не требуется. Эзомепразол: коррекция дозы не требуется
Омепразол (субстрат CYP2C19, ↑ pH желудочного сока)	Омепразол AUC _{inf} : ↓ 11 % C _{max} : ↓ 23 %	Коррекция дозы изавуконазола не требуется. Омепразол: коррекция дозы не требуется
Гиполипидемические средства		
Аторвастатин и другие статины (субстраты CYP3A4, например симвастатин, ловастатин, розувастатин) (субстраты CYP3A4/5 и/или BCRP)	Аторвастатин AUC _{inf} : ↑ 37 % C _{max} : ↑ 3 % Другие статины не изучались. Концентрации статинов могут увеличиваться (ингибирование CYP3A4/5 или BCRP)	Коррекция дозы изавуконазола не требуется. На основе результатов для аторвастатина коррекция дозы статинов не требуется. Рекомендуются тщательное наблюдение с целью выявления возможных нежелательных реакций, типичных для статинов
Пиоглитазон (слабый индуктор CYP3A4/5)	Не изучалось. Концентрации изавуконазола могут уменьшаться (индуцирование CYP3A4/5)	Совместного применения следует избегать, за исключением тех случаев, когда ожидаемая польза превышает возможный риск
Антиаритмические препараты		
Дигоксин (субстрат P-gp)	Дигоксин AUC _{inf} : ↑ 25 % C _{max} : ↑ 33 % (ингибирование P-gp)	Коррекция дозы изавуконазола не требуется. Дигоксин: следует наблюдать за концентрациями дигоксина в сыворотке и по результатам проводить титрование дозы дигоксина
Пероральные противозачаточные средства		
Этинилэстрадиол и норэтиндрон (субстраты CYP3A4/5)	Этинилэстрадиол AUC _{inf} : ↑ 8 % C _{max} : ↑ 14 % Норэтиндрон AUC _{inf} : ↑ 16 %	Коррекция дозы изавуконазола не требуется. Этинилэстрадиол и норэтиндрон: коррекция дозы не требуется.

	C_{max} : ↑ 6 %	
Противокашлевые средства		
Декстрометорфан (субстрат CYP2D6)	Декстрометорфан AUC_{inf} : ↑ 18 % C_{max} : ↑ 17 % Декстрорфан (активный метаболит) AUC_{inf} : ↑ 4 % C_{max} : ↓ 2 %	Коррекция дозы изавуконазола не требуется. Декстрометорфан: коррекция дозы не требуется
Бензодиазепины		
Мидазолам (субстрат CYP3A4/5)	Мидазолам перорально AUC_{inf} : ↑ 103 % C_{max} : ↑ 72 % (ингибирование CYP3A4)	Коррекция дозы изавуконазола не требуется. Мидазолам: рекомендуется тщательное наблюдение клинических признаков и симптомов и при необходимости — уменьшение дозы
Противоподагрические средства		
Колхицин (субстрат P-gp)	Не изучалось. Концентрации колхицина могут увеличиваться (ингибирование P-gp)	Коррекция дозы изавуконазола не требуется. Колхицин характеризуется узким терапевтическим индексом, следует проводить мониторинг и при необходимости уменьшать дозу.
Средства природного происхождения		
Кофеин (субстрат CYP1A2)	Кофеин AUC_{inf} : ↑ 4 % C_{max} : ↓ 1 %	Коррекция дозы изавуконазола не требуется. Кофеин: коррекция дозы не требуется
Средства для прекращения курения		
Бупропион (субстрат CYP2B6)	Бупропион AUC_{inf} : ↓ 42 % C_{max} : ↓ 31 % (индуцирование CYP2B6)	Коррекция дозы изавуконазола не требуется. Бупропион: при необходимости - увеличение дозы.

ННИОТ — нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (non-nucleoside reverse-transcriptase inhibitor); P-gp — P-гликопротеин.

^a Уменьшение среднего значения минимального уровня, %.

^b Индинавир исследовали только после однократного приема 400 мг изавуконазола.

AUC_{inf} — площадь под фармакокинетической кривой зависимости концентрации в плазме от времени, экстраполированная до бесконечности; AUC_{tau} — площадь под фармакокинетической кривой зависимости концентрации в плазме от времени в течение 24 ч в равновесном состоянии; C_{max} — пиковая концентрация в плазме; $C_{min,SS}$ — минимальные уровни в равновесном состоянии.

4.6. Фертильность, беременность и лактация

Женщины с детородным потенциалом

Препарат Креземба не рекомендуется принимать женщинам, способным к деторождению и не использующим контрацепцию.

Беременность

Данные по применению препарата Креземба у беременных женщин отсутствуют. Исследования на животных выявили репродуктивную токсичность (см. раздел 5.3). Потенциальный риск для человека неизвестен.

Препарат Креземба не следует использовать при беременности, за исключением случаев тяжелых или потенциально угрожающих жизни грибковых инфекций, для лечения которых может использоваться изавуконазол, если ожидаемая польза превышает возможный риск для плода.

Лактация

Имеющиеся данные исследований фармакодинамики/токсичности на животных свидетельствуют, что изавуконазол/метаболиты проникают в молоко (см. раздел 5.3).

Нельзя исключить риск для новорожденных и младенцев.

Кормление грудью должно быть прекращено во время лечения препаратом Креземба.

Фертильность

Данные о влиянии изавуконазола на фертильность у человека отсутствуют. В ходе исследований на животных не выявлено снижение фертильности самок и самцов крыс (см. раздел 5.3).

4.7. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Изавуконазол оказывает умеренное влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. Пациентам следует избегать управления автотранспортными средствами и работы с механизмами при ощущении симптомов спутанности сознания, сонливости, обморока и/или головокружения.

4.8. Нежелательные реакции

Резюме профиля безопасности

Наиболее частыми нежелательными реакциями, зарегистрированными после начала терапии, были: повышенные биохимические показатели функции печени (7,9 %), тошнота (7,4 %), рвота (5,5 %), одышка (3,2 %), боль в животе (2,7 %), диарея (2,7 %), реакция в месте инъекции (2,2 %), головная боль (2,0 %), гипокалиемия (1,7 %) и сыпь (1,7 %).

Нежелательными реакциями, которые наиболее часто приводили к окончательному прекращению применения изавуконазола, были спутанность сознания (0,7 %), острая

почечная недостаточность (0,7 %), повышение билирубина крови (0,5 %), судороги (0,5 %), одышка (0,5 %), эпилепсия (0,5 %), дыхательная недостаточность (0,5 %) и рвота (0,5 %).

Табличное резюме нежелательных реакций

В таблице 2 приведен перечень нежелательных реакций при применении изавуконазола при терапии инвазивных грибковых инфекций в зависимости от системно-органного класса (СОК) и частоты. В рамках каждой группы по частоте возникновения нежелательные реакции представлены в порядке уменьшения степени серьезности с медицинской точки зрения. Категории частоты определяются следующим образом: очень часто ($\geq 1/10$), часто (от $\geq 1/100$ до $< 1/10$), нечасто (от $\geq 1/1\ 000$ до $< 1/100$), редко (от $\geq 1/10\ 000$ до $< 1/1\ 000$), очень редко ($< 1/10\ 000$) и частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):

Системно-органный класс	Очень часто ($\geq 1/10$)	Часто (от $\geq 1/100$ до $< 1/10$)	Нечасто (от $\geq 1/1\ 000$ до $< 1/100$)
Нарушения со стороны крови и лимфатической системы			Нейтропения; тромбоцитопения [^] ; панцитопения; лейкопения [^] ; анемия [^]
Нарушения со стороны иммунной системы			Гиперчувствительность [^]
Нарушения метаболизма и питания		Гипокалиемия; пониженный аппетит	Гипомагниемия; гипогликемия; гипоальбуминемия; недостаточность питания [^]
Психические нарушения		Делирий ^{^#}	Депрессия, бессонница [^]
Нарушения со стороны нервной системы		Головная боль, сонливость	Судороги [^] ; обморок; головокружение; парестезия [^] ; энцефалопатия; предобморочное состояние; периферическая нейропатия; дисгевзия
Нарушения со стороны органа слуха и лабиринта			Вертиго
Нарушения со стороны сердца			Фибрилляция предсердий; тахикардия; брадикардия [^] ; ощущение сердцебиения; трепетание предсердий; уменьшение длительности интервала QT на электрокардиограмме; наджелудочковая

			тахикардия; желудочковая экстрасистолия; наджелудочковая экстрасистолия
Нарушения со стороны сосудов		Тромбофлебит [^]	Циркуляторный коллапс; гипотензия
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения		Одышка [^] ; острая дыхательная недостаточность [^]	Бронхоспазм; тахипноэ; кровохарканье; носовое кровотечение
Желудочно-кишечные нарушения		Рвота; диарея; тошнота; боль в животе [^]	Диспепсия; запор; вздутие живота
Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей		Повышение биохимических показателей функции печени ^{^#}	Гепатомегалия; гепатит
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей		Сыпь [^] ; зуд	Петехии; алопеция; лекарственная сыпь; дерматит [^]
Нарушения со стороны мышечной, скелетной и соединительной ткани			Боль в спине
Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей		Почечная недостаточность	
Общие нарушения и реакции в месте введения		Боль в грудной клетке [^] ; повышенная утомляемость;	Периферический отек; [^] общее недомогание; астения

[^] Указывает на группирование соответствующих предпочтительных терминов в одно медицинское явление.

[#] См. раздел «Описание отдельных нежелательных реакций» ниже.

Описание отдельных нежелательных реакций

Делирий включает в себя реакции спутанности сознания.

К повышению биохимических показателей функции печени относятся повышение активности аланинаминотрансферазы, повышение активности аспартатаминотрансферазы, повышение активности щелочной фосфатазы в крови, повышение концентрации билирубина в крови, повышение активности лактатдегидрогеназы в крови, повышение активности гамма-глутамилтрансферазы, повышение активности ферментов печени, нарушение функции печени, гипербилирубинемия, нарушение биохимических показателей функции печени и повышение активности трансаминаз.

Влияние на результаты лабораторных анализов

В двойном слепом рандомизированном клиническом исследовании с активным контролем 516 пациентов с инвазивным грибковым заболеванием, вызванным видами *Aspergillus* или другими мицелиальными грибами, на момент окончания исследуемого лечения сообщалось

18.12.2023

о повышении трансаминаз печени (аланинаминотрансферазы или аспаратаминотрансферазы) более чем в 3 раза относительно верхней границы нормы (ВГН) у 4,4 % пациентов, получавших изавуконазол. Выраженное повышение трансаминаз $> 10 \times$ ВГН наблюдалась у 1,2 % пациентов, получавших изавуконазол.

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации препарата с целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения «польза-риск» лекарственного препарата. Медицинским работникам рекомендуется сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях лекарственного препарата через национальные системы сообщения о нежелательных реакциях государств – членов Евразийского экономического союза.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1

Тел.: +7 (499) 578-02-20

Эл.почта: info@roszdravnadzor.gov.ru

<http://www.roszdravnadzor.gov.ru>

Республика Казахстан

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Адрес: 010000, г. Астана, район Байконур, ул. А. Иманова 13 (БЦ "Нурсаулет 2")

Тел.: +7 (7172) 235-135

Эл.почта: farm@dari.kz

<https://www.ndda.kz/>

Республика Беларусь

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Министерства здравоохранения Республики Беларусь

Адрес: 220037, г. Минск, Товарищеский пер. 2а

Телефон отдела фармаконадзора: +375 (17) 242-00-29

Факс: +375 (17) 242-00-29

Эл.почта: rcpl@rceth.by, rceth@rceth.by

<http://www.rceth.by>

4.9. Передозировка

Симптомы

Сверхтерапевтические дозы (эквивалентные приему изавуконазола в дозе 600 мг/сутки) оценивались в исследовании влияния препарата на интервал QT, где нежелательные явления, возникающие после начала терапии, в группе приема сверхтерапевтической дозы наблюдались чаще, чем в группе приема терапевтической дозы (эквивалентной приему изавуконазола в дозе 200 мг/сутки); среди этих нежелательных явлений были следующие: головная боль, головокружение, парестезия, сонливость, нарушения внимания, дисгевзия, сухость во рту, диарея, оральная гипестезия, рвота, приливы, тревога, беспокойство, ощущение сердцебиения, тахикардия, светобоязнь и артралгия.

Лечение

Изавуконазол не выводится при гемодиализе. Специфического антидота для изавуконазола не существует. В случае передозировки следует начать поддерживающее лечение.

5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5.1. Фармакодинамические свойства

Фармакотерапевтическая группа: противогрибковые средства системного действия; производные триазола и тетразола.

Код АТХ: J02AC05.

Механизм действия

Изавуконазол представляет собой активное вещество, которое образуется после перорального или внутривенного введения изавуконазония сульфата (см. раздел 5.2).

В основе фунгицидного действия изавуконазола лежит блокирование синтеза эргостерола, главного компонента клеточной мембраны грибов, путем ингибирования цитохром Р-450-зависимого фермента ланостерол-14-альфа-деметилазы, который обеспечивает превращение ланостерола в эргостерол. Это приводит к накоплению метилированных стерольных предшественников и снижению содержания эргостерола в клеточной мембране, что ослабляет структуру и функцию клеточной мембраны гриба.

Микробиология

В животных моделях диссеминированного и легочного аспергиллеза фармакодинамический (ФД) индекс, необходимый для оценки эффективности, рассчитывают путем деления значения площади под кривой зависимости «концентрация-время» на минимальную подавляющую концентрацию (AUC/МПК).

Однозначная корреляция между МПК *in vitro* и клиническим ответом для разных видов (*Aspergillus* и *Mucorales*) не была установлена.

Концентрации изавуконазола, требуемые для ингибирования родов *Aspergillus* и родов/видов последовательности *Mucorales in vitro* были очень вариабельны. В целом, концентрации изавуконазола, требуемые для ингибирования родов *Mucorales* выше концентраций, необходимых для ингибирования большинства родов *Aspergillus*.

Клиническая эффективность была продемонстрирована для следующих видов *Aspergillus*: *Aspergillus fumigatus*, *A. flavus*, *A. niger* и *A. terreus* (см. ниже).

Механизм(-ы) резистентности

Сниженная чувствительность к противогрибковым средствам триазольного ряда связана с мутациями генов грибов *sur51A* и *sur51B*, кодирующих белок-мишень ланостерол-14-альфа-деметилазу, задействованный в биосинтезе эргостерола. Сообщалось о штаммах

грибов со сниженной чувствительностью к изавуконазолу *in vitro*, нельзя исключать наличие перекрестной резистентности к вориконазолу и другими противогрибковыми средствами триазольного ряда.

EUCAST пограничные значения

Виды <i>Aspergillus</i>	Пограничные значения минимальной подавляющей концентрации (МПК) (мг/л)	
	≤Ч (Чувствительный)	>Р (Резистентный)
<i>Aspergillus flavus</i>	1	2
<i>Aspergillus fumigatus</i>	1	2
<i>Aspergillus nidulans</i>	0.25	0.25
<i>Aspergillus terreus</i>	1	1

В настоящее время недостаточно данных для установления клинических пограничных значений для других видов *Aspergillus*.

Клиническая эффективность и безопасность

Лечение инвазивного аспергиллеза

Безопасность и эффективность изавуконазола для терапии пациентов с инвазивным аспергиллезом была оценена в ходе двойного слепого клинического исследования с активным контролем у 516 пациентов с инвазивными грибковыми заболеваниями, вызванными видами *Aspergillus* и другими мицелиальными грибами. В группе ИТТ («пациенты, которым назначено лечение») (ИТТ), 258 пациентов получали изавуконазол и 258 пациентов получали вориконазол. Изавуконазол вводили внутривенно (эквивалентно 200 мг изавуконазола) каждые 8 часов в течение первых 48 часов с последующим введением один раз в сутки внутривенно или перорально (эквивалентно 200 мг изавуконазола). Указанная в протоколе максимальная продолжительность лечения составляла 84 дня. Медианная продолжительность лечения составляла 45 дней.

Общий ответ на момент окончания терапии (ОТ) в популяции муИТТ (пациенты с доказанным и предполагаемым инвазивным аспергиллезом на основании результатов цитологических, гистологических и культуральных исследований или теста на галактоманнан) был оценен Комитетом по анализу данных в слепом режиме. Популяция муИТТ состояла из 123 пациентов, получавших изавуконазол, и 108, получавших вориконазол. Общий ответ в указанной популяции был достигнут у 43 пациентов (35 %) в группе получавших изавуконазол и у 42 пациентов (38,9 %) в группе получавших вориконазол. Скорректированная относительная разница результатов лечения (вориконазол — изавуконазол) составляла 4,0 % (95 % доверительный интервал: -7,9; 15,9).

Показатель летальности от всех причин для данной популяции в день 42 составляло 18,7 % в группе получавших изавуконазол и 22,2 % в группе получавших вориконазол. Скорректированная относительная разница результатов лечения (изавуконазол — вориконазол) составляла -2,7 % (95 % доверительный интервал: -12,9; 7,5).

Лечение мукормикоза

В ходе открытого неконтролируемого исследования 37 пациентов с доказанным или предполагаемым мукормикозом получали изавуконазол в таком же режиме дозирования, что и для лечения инвазивного аспергиллеза. Медианная продолжительность лечения составляла 84 дня для всей популяции пациентов с мукормикозом и 102 дня для 21 пациента, которые ранее не получали лечение от мукормикоза. Для пациентов с предполагаемым или доказанным мукормикозом, согласно оценке Комитета по анализу данных, количество летальных исходов любой этиологии в день 84 составляло 43,2 % (16/37) для общей популяции пациентов, 42,9 % (9/21) для пациентов с мукормикозом, получавших изавуконазол в качестве первичной терапии, и 43,8 % (7/16) для пациентов с мукормикозом, получавших изавуконазол, у которых была выявлена резистентность или непереносимость предыдущего лечения противогрибковыми средствами (в большинстве случаев на основе амфотерицина В). Показатель общего успеха терапии на момент окончания терапии по оценке Комитета по анализу данных составлял 11/35 (31,4 %), при этом 5 пациентов были признаны полностью излечившимися и 6 — частично излечившимися. Стабильный ответ также был достигнут у 10/35 пациентов (28,6 %). Из 9 пациентов с мукормикозом, вызванным видом *Rhizopus*, у 4 пациентов достигнут благоприятный ответ на изавуконазол. У 5 пациентов с мукормикозом, вызванным видом *Rhizomucor*, благоприятный ответ не достигнут. Клинический опыт в отношении других видов крайне ограничен (*Lichtheimia* n = 2, *Cunninghamella* n = 1, *Actinomucor elegans* n = 1).

Дети

Европейское агентство по лекарственным средствам отсрочило выполнение обязательства о предоставлении результатов исследований применения препарата Креземба в одной или нескольких субпопуляциях пациентов детского возраста для лечения инвазивного аспергиллеза и лечения мукормикоза (сведения о применении у детей см. в разделе 4.2).

5.2. Фармакокинетические свойства

Изавуконазония сульфат представляет собой водорастворимое пролекарство, которое можно вводить внутривенно в виде инфузий или перорально в виде твердых капсул. После введения изавуконазония сульфат быстро гидролизруется эстеразами плазмы до активной составляющей, изавуконазола; концентрации пролекарства в плазме очень малы и могут быть обнаружены только в течение короткого времени после внутривенного введения.

Абсорбция

После перорального приема препарата Креземба здоровыми добровольцами активная составляющая, изавуконазол, абсорбируется, и максимальная концентрация в плазме крови (C_{max}) достигается приблизительно через 2–3 ч после введения одной или нескольких доз (см. таблицу 3).

Таблица 3. Фармакокинетические параметры изавуконазола в равновесном состоянии после перорального введения препарата Креземба

Параметр Статистика	Изавуконазол 200 мг (n = 37)	Изавуконазол 600 мг (n = 32)
C_{max} (нг/мл)		
Среднее	7499	20 028
CO	1893,3	3584,3
КВ(%)	25,2	17,9

t_{\max} (ч)		
Медиана	3,0	4,0
Диапазон	2,0–4,0	2,0–4,0
AUC (ч·нг/мл)		
Среднее	121 402	352 805
CO	35 768,8	72 018,5
KB (%)	29,5	20,4

Согласно данным, приведенным в таблице 4 ниже, абсолютная биодоступность изавуконазола после перорального приема одной дозы препарата Креземба составляет 98 %. На основе указанных результатов можно сделать вывод о допустимости взаимозаменяемого введения препарата внутривенно и перорально.

Таблица 4. Сравнение фармакокинетики при пероральном и внутривенном введении препарата (средние значения)

	ISA 400 мг перорально	ISA 400 мг внутривенно
AUC (ч·нг/мл)	189 462,8	193 906,8
KB (%)	36,5	37,2
Период полувыведения (ч)	110	115

Влияние приема пищи на всасывание

Пероральный прием препарата Креземба (количество, эквивалентное 400 мг изавуконазола) с пищей с высоким содержанием жира приводит к уменьшению C_{\max} изавуконазола на 9 % и увеличению AUC на 9 %. Препарат Креземба можно принимать вне зависимости от приема пищи.

Распределение

Изавуконазол активно распределяется, средний равновесный объем распределения (V_{ss}) составляет около 450 л. Изавуконазол в значительной степени (> 99 %) связывается с белками плазмы крови человека, в основном с альбумином.

Биотрансформация

Исследования *in vitro/in vivo* свидетельствуют о том, что в метаболизме изавуконазола задействованы CYP3A4, CYP3A5, и затем — уридиндифосфатглюкуронилтрансфераз (УГТ).

После однократного введения добровольцам дозы [циано- ^{14}C] изавуконазония и [пиридинилметил- ^{14}C] изавуконазония сульфата, в дополнение к активной составляющей (изавуконазол) и неактивному продукту распада, было выявлено определенное количество второстепенных метаболитов. В составе всего вещества, меченого радиоизотопами, отдельные метаболиты с AUC > 10 % (за исключением активной составляющей, изавуконазола) не выявлены.

Элиминация

После перорального введения здоровым добровольцам изавуконазония сульфата, меченого радиоизотопами, в среднем 46,1 % дозы радиоактивного изотопа было выявлено в кале и 45,5 % — в моче.

18.12.2023

Экскреция почками изавуконазола в неизмененном виде составляла менее 1 % введенной дозы.

Неактивные продукты распада в основном метаболизируются с последующей экскрецией метаболитов почками.

Линейность (нелинейность)

В ходе исследований с участием здоровых добровольцев была доказана линейность фармакокинетики изавуконазола вплоть до дозы 600 мг/сутки.

Почечная недостаточность

Клинически значимые изменения суммарных показателей C_{max} и AUC изавуконазола у пациентов с легким, умеренным и тяжелым нарушением функции почек по сравнению с пациентами с нормальной функцией почек не были отмечены. Из 403 пациентов, принимавших изавуконазол в ходе исследований фазы 3, у 79 пациентов (20 %) скорость клубочковой фильтрации (СКФ) составляла менее 60 мл/мин/1,73 м². У пациентов с нарушением функции почек коррекция дозы препарата не требуется, включая пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности. Изавуконазол плохо выводится посредством диализа (см. раздел 4.2).

Печеночная недостаточность

После однократного введения 100 мг изавуконазола 32 пациентам с легкой (класс А по классификации Чайлд-Пью) печеночной недостаточностью и 32 пациентам с умеренной (класс В по классификации Чайлд-Пью) печеночной недостаточностью (16 пациентов получили препарат внутривенно и 16 перорально для каждого класса по классификации Чайлд-Пью) среднее системное воздействие (AUC), рассчитанное методом наименьших квадратов, увеличилось на 64 % в группе класса А по классификации Чайлд-Пью и на 84 % в группе класса В по классификации Чайлд-Пью по сравнению с группой из 32 здоровых добровольцев с нормальной функцией печени, подобранных по массе и возрасту. Средние концентрации в плазме (C_{max}) были на 2 % ниже в группе класса А по классификации Чайлд-Пью и на 30 % ниже в группе класса В по классификации Чайлд-Пью. В ходе оценки популяционной фармакокинетики изавуконазола у здоровых добровольцев и у пациентов с легкими или умеренными нарушениями функции печени было установлено, что у пациентов с легкими или умеренными нарушениями функции печени значения клиренса изавуконазола были на 40 % и 48 % соответственно ниже, чем у здоровых добровольцев.

У пациентов с нарушением функции печени легкой или умеренной степени коррекция дозы препарата не требуется.

Изавуконазол не изучался у пациентов с тяжелым нарушением функции печени (класс С по классификации Чайлд-Пью). Применение у таких пациентов не рекомендуется, за исключением случаев, когда ожидаемая польза от его применения превышает возможный риск (см. разделы 4.2 и 4.4).

Дети

Фармакокинетика у пациентов детского возраста (< 18 лет) на данный момент не была оценена. Данные отсутствуют.

5.3. Данные доклинической безопасности

У крыс и кроликов системное воздействие изавуконазола в дозах менее терапевтической дозы было связано с дозозависимым повышением частоты возникновения аномалий строения скелета (рудиментарные дополнительные ребра) у потомства. У крыс также было отмечено дозозависимое повышение частоты возникновения сращения скуловой дуги у потомства (см. раздел 4.6).

При введении изавуконазония сульфата крысам в дозе 90 мг/кг/сутки (приблизительно в 1,0 раза превышает системную экспозицию при клинической поддерживающей дозе для человека 200 мг изавуконазола) во время беременности и вплоть до прекращения вскармливания было установлено увеличение перинатальной смертности детенышей. Воздействие активного вещества, изавуконазола, *in utero* не влияло на фертильность выживших детенышей.

Внутривенное введение ^{14}C -маркированного изавуконазония сульфата крысам в период лактации привело к обнаружению радиоактивных меток в молоке.

Изавуконазол не влиял на фертильность самок и самцов крыс, получавших перорально дозы вплоть до 90 мг/кг/сутки (приблизительно в 1,0 раз превышает системное воздействие при клинической поддерживающей дозе 200 мг изавуконазола для человека).

Изавуконазол не обладает явным мутагенным или генотоксичным потенциалом. Для изавуконазола получен отрицательный результат в анализе обратных мутаций у бактерий, он был слабо кластогенным при цитотоксических концентрациях в ходе анализа хромосомных aberrаций на клетках лимфомы мышей L5178Y tk+/-, также для него не установлено биологически связанное или статистически значимое увеличение частоты образования микроядер в ходе микроядерного теста на крысах *in vivo*.

Изавуконазол продемонстрировал канцерогенный потенциал в 2-летних исследованиях канцерогенности на грызунах. В основе возникновения опухолей печени и щитовидной железы, вероятно, лежит специфический для грызунов механизм, который не значим для человека. У самцов крыс наблюдались фибромы и фибросаркомы кожи. Механизм, лежащий в основе этого эффекта, неизвестен. У самок крыс наблюдались аденомы эндометрия и карциномы матки, которые, вероятно, обусловлены гормональными нарушениями. Профиль безопасности в отношении этих эффектов отсутствует. Значимость опухолей кожи и матки для человека не может быть исключена.

Изавуконазол ингибировал калиевый канал hERG и кальциевый канал L-типа с IC_{50} 5,82 мкМ и 6,57 мкМ соответственно (34-кратно и 38-кратно относительно C_{max} для небелковых связей у человека при максимальной рекомендуемой клинической дозе (МРКД), соответственно). В ходе токсикологического исследования воздействия повторных доз *in vivo* на обезьянах продолжительностью 39 недель не обнаружено увеличение QTcF для доз вплоть до 40 мг/кг/сутки (приблизительно в 1,0 раз превышает системное воздействие при клинической поддерживающей дозе 200 мг изавуконазола для человека).

В ходе оценки риска для окружающей среды было установлено, что препарат Креземба может представлять риск для водной среды.

6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6.1. Перечень вспомогательных веществ

Содержимое капсулы

Магния цитрат безводный

Целлюлоза микрокристаллическая РН-112

Тальк

Кремния диоксид коллоидный

Стеариновая кислота

Корпус капсулы

Гипромеллоза

Вода очищенная

Краситель железа оксид красный

Титана диоксид

Геллановая камедь

Калия ацетат

Динатрия эдетат

Натрия лаурилсульфат

Крышечка капсулы

Гипромеллоза

Вода очищенная

Титана диоксид

Геллановая камедь

Калия ацетат

Динатрия эдетат

Натрия лаурилсульфат

Чернила

Шеллак

Пропиленгликоль

Аммиака раствор концентрированный

Краситель железа оксид черный

Калия гидроксид

6.2. Несовместимость

Неприменимо.

6.3. Срок годности (срок хранения)

30 месяцев.

6.4. Особые меры предосторожности при хранении

Хранить при температуре не выше 25°C, в оригинальной упаковке для защиты от влаги.

6.5. Характер и содержание первичной упаковки

7 капсул в полиамид/ПВХ/алюминиевый блистер (каждая ячейка, содержащая капсулу, соединена с ячейкой, содержащей влагопоглотитель).

2 блистера вместе с инструкцией по медицинскому применению (листочком-вкладышем) в картонной пачке с контролем первого вскрытия.

6.6. Особые меры предосторожности при уничтожении использованного лекарственного препарата или отходов, полученных после применения лекарственного препарата и другие манипуляции с препаратом

Весь оставшийся лекарственный препарат и отходы следует уничтожить в установленном порядке.

7. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Соединенные Штаты Америки

Пфайзер Инк.

235 Ист 42 Стрит, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10017

Тел.: +1 (212) 733-23-23

<https://www.pfizer.com/contact/email>

7.1. Представитель держателя регистрационного удостоверения

Претензии потребителей направлять по адресу:

Республика Беларусь

Представительство Частной компании с ограниченной ответственностью «Pfizer Export B.V.» (Королевство Нидерландов) в Республике Беларусь

Адрес: 220036, г. Минск, пр. Дзержинского 8, офис 403

Тел.: +375 (17) 309-38-00

Факс: +375 (17) 309-38-19

Эл.почта: belarusro@pfizer.com

Российская Федерация

ООО «Пфайзер Инновации»

Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, БЦ «Башня на Набережной» (Блок С)

Тел.: +7 (495) 287-50-00

Факс: +7 (495) 287-53-00

Эл.почта: Russia@pfizer.com

Республика Казахстан

Филиал компании Pfizer Export B.V. (Пфайзер Экспорт Би.Ви.) в Республике Казахстан

Адрес: 050000, г. Алматы, Медеуский район, пр. Н. Назарбаева, д. 100/4

Тел.: +7 (727) 250 09 16

Факс: +7 (727) 250 42 09

18.12.2023

Эл. почта: PfizerKazakhstan@pfizer.com

8. НОМЕР РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

9. ДАТА ПЕРВИЧНОЙ РЕГИСТРАЦИИ (ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ, ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ)

Дата первой регистрации:

10. ДАТА ПЕРЕСМОТРА ТЕКСТА

Общая характеристика лекарственного препарата Креземба доступна на информационном портале Евразийского экономического союза в информационно-коммуникационной сети «Интернет» <https://eec.eaeunion.org>.