

**VEUILLEZ LIRE CE DOCUMENT POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET
EFFICACE DU MÉDICAMENT
RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PATIENTS**

Daptomycine pour injection

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à prendre **Daptomycine pour injection** et chaque fois que votre ordonnance est renouvelée. Ce feuillet est un résumé et il ne contient donc pas tous les renseignements pertinents au sujet de ce produit. Discutez avec votre professionnel de la santé de votre maladie et de votre traitement et demandez-lui si de nouveaux renseignements sur **Daptomycine pour injection** sont disponibles.

Pourquoi utilise-t-on Daptomycine pour injection?

Daptomycine pour injection est utilisé pour le traitement :

- des infections bactériennes de la peau et des tissus mous (patients de 1 an et plus);
- des infections bactériennes du sang (patients de 1 an et plus);
- de certaines infections des valvules cardiaques (patients de 18 ans et plus).

Les antibactériens comme **Daptomycine pour injection** traitent uniquement les infections causées par des bactéries. Ils ne traitent pas les infections virales. Bien qu'il soit possible que vous vous sentiez mieux dès le début du traitement, vous devez utiliser **Daptomycine pour injection** conformément aux directives. Un mauvais usage ou un usage excessif de **Daptomycine pour injection** pourrait entraîner la croissance de bactéries que **Daptomycine pour injection** ne peut pas éliminer (résistance). Cela signifie que **Daptomycine pour injection** pourrait ne plus être efficace pour vous à l'avenir.

Comment Daptomycine pour injection agit-il?

Daptomycine pour injection est un antibiotique. Il agit en éliminant certaines bactéries qui causent des infections.

Quels sont les ingrédients de Daptomycine pour injection?

Ingrédient médicamenteux : daptomycine

Ingrédients non médicamenteux : hydroxyde de sodium

Sous quelles formes se présente Daptomycine pour injection?

Poudre lyophilisée pour solution en fiole de 350 mg et de 500 mg

Daptomycine pour injection ne doit pas être utilisé si :

- vous êtes allergique à la daptomycine.

Pour aider à éviter les effets secondaires et assurer une utilisation appropriée du médicament, discutez avec votre professionnel de la santé avant de prendre Daptomycine pour injection. Informez-le de toutes vos maladies et de tous vos problèmes de santé, notamment :

- si vous souffrez de problèmes aux reins ou de problèmes sévères au foie;
- si vous avez un taux élevé de créatine phosphokinase (CPK) dans le sang;

- si vous êtes enceinte ou envisagez de le devenir;
- si vous allaitez ou envisagez d'allaiter. L'allaitement doit cesser pendant la prise de **Daptomycine pour injection**;
- si vous êtes allergique à un antibiotique quelconque ou à d'autres médicaments;
- si vous prenez d'autres médicaments (voir **Les médicaments suivants peuvent interagir avec Daptomycine pour injection**);
- si vous avez des questions au sujet de votre traitement, avant ou pendant le traitement.

Autres mises en garde que vous devez connaître :

Cessez de prendre **Daptomycine pour injection** et communiquez immédiatement avec votre médecin si :

- vous présentez une diarrhée sévère ou persistante (sanglante ou aqueuse) accompagnée ou non
 - de fièvre;
 - de douleurs ou d'une sensibilité abdominales.

Vous pourriez avoir une colite causée par la bactérie *Clostridium difficile* (inflammation intestinale).

Indiquez à votre médecin tous les produits médicaux que vous prenez, qu'il s'agisse de médicaments, de vitamines, de minéraux, de suppléments naturels ou de produits de médecine douce.

Les médicaments suivants peuvent interagir avec Daptomycine pour injection :

- les médicaments qui abaissent le taux de cholestérol (les inhibiteurs de l'HMG-CoA réductase aussi connus sous le nom de « statines », tels que l'atorvastatine, la fluvastatine, la lovastatine, la pravastatine, la rosuvastatine et la simvastatine);
- la tobramycine (un autre antibiotique);
- les anticoagulants (la warfarine).

Comment prendre Daptomycine pour injection?

Daptomycine pour injection sera administré par voie intraveineuse (injecté dans une veine) par un médecin ou une infirmière dans un hôpital ou un milieu clinique.

Dose habituelle :

Adultes :

Infections graves de la peau : La dose habituelle pour les adultes est de 4 mg pour chaque kilogramme de poids corporel, sous forme de solution injectée dans une veine. La dose est injectée toutes les 24 heures pendant 7 à 14 jours, sur une période de 30 minutes ou une période de 2 minutes.

Infections bactériennes du sang, y compris certaines infections des valvules cardiaques : La dose habituelle pour les adultes est de 6 mg pour chaque kilogramme de poids corporel, sous forme de solution injectée dans une veine. La dose est injectée toutes les 24 heures pendant 10 à 42 jours, sur une période de 30 minutes ou une période de 2 minutes.

Enfants :

Votre médecin déterminera quelle quantité de **Daptomycine pour injection** administrer à votre enfant selon son âge, son poids et le type d'infection dont il est atteint.

Infections graves de la peau :

Groupe d'âge	Posologie	Durée du traitement
12 à 17 ans	5 mg/kg 1 fois par 24 heures, en perfusion de 30 minutes	Jusqu'à 14 jours
7 à 11 ans	7 mg/kg 1 fois par 24 heures, en perfusion de 30 minutes	
2 à 6 ans	9 mg/kg 1 fois par 24 heures, en perfusion de 60 minutes	
1 à < 2 ans	10 mg/kg 1 fois par 24 heures, en perfusion de 60 minutes	

Infections bactériennes du sang :

Groupe d'âge	Posologie	Durée du traitement
12 à 17 ans	7 mg/kg 1 fois par 24 heures, en perfusion de 30 minutes	Jusqu'à 42 jours
7 à 11 ans	9 mg/kg 1 fois par 24 heures, en perfusion de 30 minutes	
1 à 6 ans	12 mg/kg 1 fois par 24 heures, en perfusion de 60 minutes	

Surdose :

Si vous pensez avoir pris plus de **Daptomycine pour injection** que vous n'auriez dû, communiquez immédiatement avec votre professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même si vous ne présentez aucun symptôme.

Quels sont les effets secondaires possibles de Daptomycine pour injection?

La liste ci-dessous ne comprend pas tous les effets secondaires qu'il est possible de présenter lorsqu'on prend **Daptomycine pour injection**. Si vous avez un effet secondaire qui ne figure pas dans la liste, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Les effets secondaires fréquents sont les suivants :

- maux de tête ou étourdissements;
- diarrhée ou constipation;
- nausées ou vomissements;
- éruptions cutanées ou démangeaisons;
- difficulté à dormir.

Effets secondaires graves et mesures à prendre

Symptôme/effet	Consultez votre professionnel de la santé		Cessez de prendre le médicament et consultez un médecin immédiatement
	Seulement pour les effets secondaires sévères	Dans tous les cas	
<p>PEU FRÉQUENT</p> <p>Réaction allergique grave se manifestant par des symptômes comme :</p> <ul style="list-style-type: none"> • essoufflement, difficulté à avaler; • urticaire, démangeaisons, éruptions d'origine médicamenteuse, lésions ressemblant à des cloques; • enflure de la bouche, de la gorge, des lèvres et des membres (œdème de Quincke). 		X	
<p>Douleurs dans les mains et les pieds se manifestant par des symptômes comme :</p> <ul style="list-style-type: none"> • sensation de brûlure, fourmillements, engourdissements; • douleurs musculaires, faiblesse ou fatigue (myopathie). 		X	
Rythme cardiaque irrégulier		X	
<p>Troubles rénaux se manifestant par des symptômes comme :</p> <ul style="list-style-type: none"> • réduction de la fonction rénale, insuffisance rénale ; • augmentation des envies d'uriner, présence de sang dans l'urine; • douleur au bas du dos, pression dans la vessie; • fatigue et nausées. 		X	
<p>TRÈS RARE</p> <p>Problèmes respiratoires se manifestant par des symptômes comme :</p> <ul style="list-style-type: none"> • fièvre, toux, essoufflement ou difficulté à respirer (pneumonie à éosinophiles); • inflammation des poumons (pneumonie en voie d'organisation). 		X	

Si vous présentez un symptôme ou un effet secondaire incommodant qui n'est pas mentionné ici, ou que celui-ci s'aggrave au point de perturber vos activités quotidiennes, consultez votre professionnel de la santé.

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer à Santé Canada les effets indésirables soupçonnés associés à l'utilisation des produits de santé de l'une des deux façons suivantes :

- En visitant la page Web sur la déclaration des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour savoir comment déclarer un effet indésirable en ligne, par courrier ou par télécopieur; ou
- Par téléphone, en composant le numéro sans frais 1-866-234-2345.

REMARQUE : Si vous désirez obtenir des renseignements sur la prise en charge des effets secondaires, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé. Le Programme Canada Vigilance ne fournit pas de conseils médicaux.

Conservation :

Les fioles de **Daptomycine pour injection** contenant de la poudre lyophilisée doivent être entreposées à une température de 2 à 8 °C.

Les solutions reconstituées doivent être utilisées immédiatement ou être réfrigérées (entre 2 et 8 °C) et utilisées dans les 72 heures, après quoi elles doivent être jetées. Les professionnels de la santé devraient consulter la monographie du produit pour obtenir de plus amples renseignements.

Garder hors de la portée et de la vue des enfants.

Pour en savoir plus sur Daptomycine pour injection :

- Communiquez avec votre professionnel de la santé.
- Lisez la monographie intégrale, rédigée à l'intention des professionnels de la santé. Celle-ci renferme également les Renseignements destinés aux patients. Vous pouvez les obtenir sur le site Web de Santé Canada (<https://produits-sante.canada.ca/dpd-bdpp/index-fra.jsp>), le site Web de Pfizer Canada inc. (www.pfizer.ca) ou en appelant le promoteur, Pfizer Canada inc., au 1-800-463-6001.

Ce feuillet a été préparé par :

Pfizer Canada SRI
Kirkland (Québec) H9J 2M5

Dernière révision : 3 mai 2019