

## RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PATIENTS

### LISEZ CE DOCUMENT POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

#### **Pr DEPO-MEDROL AVEC LIDOCAÏNE\***

Suspension injectable d'acétate de méthyprednisolone et de chlorhydrate de lidocaïne

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à recevoir **DEPO-MEDROL avec lidocaïne** et chaque fois que votre ordonnance est renouvelée. Ce feuillet est un résumé et il ne contient donc pas tous les renseignements pertinents au sujet de ce produit. Discutez avec votre professionnel de la santé de votre maladie et de votre traitement et demandez-lui si de nouveaux renseignements sur **DEPO-MEDROL avec lidocaïne** sont disponibles.

#### **Pourquoi utilise-t-on DEPO-MEDROL avec lidocaïne?**

DEPO-MEDROL avec lidocaïne est utilisé chez l'adulte en traitement complémentaire de l'inflammation aiguë des articulations ou des tendons ou de l'aggravation de l'inflammation de ces structures.

#### **Comment DEPO-MEDROL avec lidocaïne agit-il?**

- DEPO-MEDROL avec lidocaïne renferme de l'acétate de méthyprednisolone et du chlorhydrate de lidocaïne.
- La méthyprednisolone fait partie d'une classe de médicaments appelés hormones corticostéroïdes. Si on l'injecte dans le corps, elle diminue la réponse immunitaire de l'organisme à certaines maladies, ce qui aide à réduire les symptômes causés par l'inflammation.
- La lidocaïne est un anesthésique local. Son injection permet d'engourdir une certaine partie du corps, ce qui aide à réduire la douleur et l'inflammation.

#### **Quels sont les ingrédients de DEPO-MEDROL avec lidocaïne?**

Ingrédient(s) médicinal(aux) : Acétate de méthyprednisolone et chlorhydrate de lidocaïne.

Ingrédients non médicinaux : Alcool benzylique, chlorure de myristyl-gamma-picolinium, polyéthylèneglycol 3350, chlorure de sodium et eau pour préparation injectable.

#### **DEPO-MEDROL avec lidocaïne se présente sous la ou les formes pharmaceutiques suivantes :**

Suspension : acétate de méthyprednisolone dosée à 40 mg/mL et chlorhydrate de lidocaïne dosée à 10 mg/mL.

#### **N'utilisez pas DEPO-MEDROL avec lidocaïne dans les cas suivants :**

- vous êtes allergique :
  - à l'acétate de méthyprednisolone, ou
  - à n'importe quel autre stéroïde, ou
  - à la lidocaïne ou à n'importe quel autre anesthésique local semblable, ou
  - à n'importe quel autre ingrédient de DEPO-MEDROL avec lidocaïne;
- vous avez une infection fongique;
- vous avez une maladie du sang appelée purpura thrombopénique idiopathique (nombre insuffisant de plaquettes). DEPO-MEDROL avec lidocaïne ne doit pas être administré par voie intramusculaire;
- vous avez reçu un vaccin vivant ou un vaccin vivant atténué;

- vous avez une maladie virale y compris la vaccine (cowpox), la varicelle (picote) et une infection de l'œil par le virus de l'herpès;
- vous avez une articulation instable, lorsque DEPO-MEDROL est injecté dans une articulation.

DEPO-MEDROL avec lidocaïne ne doit pas être :

- injecté dans un muscle, une veine ou dans la colonne vertébrale;
- administré aux nourrissons prématurés, car il contient de l'alcool benzylique.

**Consultez votre professionnel de la santé avant de recevoir DEPO-MEDROL avec lidocaïne, afin d'aider à éviter les effets secondaires et assurer la bonne utilisation du médicament. Informez votre professionnel de la santé de tous vos problèmes et états de santé, notamment si :**

- vous avez une infection (herpès simplex, varicelle, tuberculose, infection par un parasite [nématode]);
- vous avez fait un infarctus du myocarde (crise cardiaque) récemment;
- vous avez un problème de conduction cardiaque, c'est-à-dire un problème avec le système électrique qui contrôle la fréquence et le rythme de votre cœur;
- vos battements cardiaques sont anormalement lents;
- votre volume sanguin est trop faible (hypovolémie);
- vous avez un trouble thromboembolique (trouble hémorragique ou trouble de la coagulation);
- vous avez les os fragiles (ostéoporose);
- vous faites de la haute pression (hypertension);
- vous faites de la rétention d'eau (œdème);
- vous faites de l'épilepsie, des crises convulsives;
- vous avez des problèmes de thyroïde;
- vous ressentez une douleur ou une faiblesse musculaire (par exemple, myasthénie grave);
- vous avez des problèmes cardiaques (comme une insuffisance cardiaque);
- vous avez une maladie de l'œil (par exemple, glaucome, cataractes ou infection par le virus de l'herpès);
- vous avez une maladie des reins;
- vous avez une maladie du foie (comme une cirrhose);
- vous avez un trouble psychiatrique ou un trouble de l'humeur (comme la dépression);
- vous avez des problèmes d'estomac ou d'intestins (ulcère, colite ulcéreuse);
- vous avez un faible taux de potassium ou de calcium;
- vous êtes atteint de la maladie de Cushing (causée par un excès de cortisol, une hormone);
- votre système immunitaire est affaibli;
- votre taux de sucre dans le sang est élevé (hyperglycémie);
- vous êtes atteint de sclérose systémique, une maladie causée par une production excessive par l'organisme d'une protéine appelée *collagène*.

### **Autres mises en garde**

**Effets secondaires graves :** DEPO-MEDROL avec lidocaïne peut causer des effets indésirables graves, comme :

- Un cancer de la peau (sarcome de Kaposi). Des cas de sarcome de Kaposi ont été signalés chez des patients traités par un corticostéroïde tel que DEPO-MEDROL avec lidocaïne. Après l'arrêt du traitement par DEPO-MEDROL, il est possible de constater des signes de disparition de ce cancer.

- Une tumeur des glandes surrénales (phéochromocytome). Des cas de tumeur de ce type ont été signalés chez des patients traités par un corticostéroïde tel que DEPO-MEDROL avec lidocaïne. Le phéochromocytome peut être mortel.
- Une accumulation de gras sur ou à l'extérieur d'une membrane qui enveloppe la moelle épinière (lipomatose épidurale).
- DEPO-MEDROL avec lidocaïne peut causer des réactions graves et potentiellement mortelles. Votre professionnel de la santé vous administrera DEPO-MEDROL avec lidocaïne dans un établissement qui permet d'entreprendre un traitement immédiat.

#### **Immunosuppression :**

- DEPO-MEDROL avec lidocaïne peut :
  - masquer les symptômes d'une infection;
  - causer de nouvelles infections en abaissant la résistance de l'organisme.
- Informez votre professionnel de la santé que vous prenez DEPO-MEDROL avec lidocaïne, car ce médicament peut modifier les résultats des tests cutanés.

**Fertilité masculine :** Le traitement par DEPO-MEDROL avec lidocaïne peut nuire à la fertilité masculine.

#### **Grossesse et allaitement :**

- Si vous êtes enceinte ou apte à concevoir ou si vous allaitez, vous devez discuter de certains risques avec votre professionnel de la santé. Prendre DEPO-MEDROL avec lidocaïne peut :
  - ralentir la croissance du bébé et faire en sorte qu'il ait un faible poids à la naissance;
  - causer des cataractes chez les bébés. Ce risque est présent chez les mères qui reçoivent des corticostéroïdes pendant une grande partie de la grossesse.
- Si vous allaitez ou avez l'intention de le faire, parlez-en à votre professionnel de la santé.

**Si vous devez subir une intervention chirurgicale, dentaire ou autre,** mentionnez au médecin, au dentiste ou à l'anesthésiste que vous recevez DEPO-MEDROL avec lidocaïne.

#### **Enfants (moins de 18 ans) :**

- Les corticostéroïdes peuvent perturber la croissance chez l'enfant.
- DEPO-MEDROL avec lidocaïne contient de l'alcool benzylique. DEPO-MEDROL avec lidocaïne est déconseillé chez les nourrissons, car l'alcool benzylique peut causer un « syndrome de halètement » potentiellement mortel.

#### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

DEPO-MEDROL avec lidocaïne peut causer des étourdissements, des vertiges, des troubles visuels, de la fatigue ainsi que des problèmes temporaires de mobilité et de mouvement. Si vous éprouvez ces effets secondaires, il faut éviter de conduire et d'utiliser des machines.

**Mentionnez à votre professionnel de la santé tous les médicaments et produits de santé que vous prenez, y compris : médicaments d'ordonnance et en vente libre, vitamines, minéraux, suppléments naturels et produits de médecine douce.**

### Les produits ci-dessous pourraient interagir avec DEPO-MEDROL avec lidocaïne :

- médicaments pour traiter le glaucome et l'épilepsie, comme l'acétazolamide;
- médicaments pour prévenir ou soulager les nausées et les vomissements, comme l'aprépitant ou le fosaprépitant;
- médicaments contre le cancer, comme l'aminoglutéthimide ou le cyclophosphamide;
- médicaments anticoagulants (pour « éclaircir » le sang), comme l'acénocoumarol, le phénindione et la warfarine;
- médicaments pour traiter la myasthénie (maladie qui touche les muscles), comme la distigmine et la néostigmine;
- antibiotiques et antifongiques (comme le kétoconazole, l'itraconazole, l'amphotéricine B, l'érythromycine, la clarithromycine, la troléandomycine, la rifampine et la rifabutine);
- aspirine et anti-inflammatoires non stéroïdiens (aussi appelés AINS), comme l'ibuprofène;
- médicaments pour traiter l'épilepsie, comme les barbituriques, la carbamazépine, la phénytoïne et la primidone;
- médicaments contre les brûlures d'estomac et l'indigestion causée par l'hyperacidité, comme la cimétidine;
- cyclosporine;
- médicaments pour les problèmes cardiaques ou la pression artérielle élevée, comme les bloqueurs des canaux calciques, la digoxine et le diltiazem;
- diurétiques (pour éliminer le surplus d'eau);
- hormonothérapie substitutive ou contraceptifs oraux à base d'hormones;
- médicaments contre l'infection à VIH, comme l'indinavir ou le ritonavir;
- pancuronium ou vécuronium – ou autres médicaments appelés « agents de blocage neuromusculaire », utilisés lors de certaines interventions chirurgicales;
- tacrolimus, utilisé après une greffe d'organe pour en prévenir le rejet;
- vaccins – si vous avez eu un vaccin récemment ou si vous êtes sur le point d'en avoir un, informez-en le médecin ou l'infirmière;
- médicaments contre le diabète;
- médicaments contre la tuberculose;
- médicaments qui abaissent le taux de cholestérol (cholestyramine);
- inhibiteurs de l'aromatase (médicaments utilisés pour le traitement des cancers du sein et de l'ovaire);
- immunosuppresseurs (médicaments qui neutralisent ou qui affaiblissent le système immunitaire);
- autres anesthésiques locaux;
- antiarythmiques de la classe Ib.

Ne buvez pas de jus de pamplemousse pendant votre traitement par DEPO-MEDROL avec lidocaïne.

### Comment DEPO-MEDROL avec lidocaïne s'administre-t-il?

- DEPO-MEDROL avec lidocaïne vous sera administré par votre professionnel de la santé, en injection intrasynoviale dans l'articulation ou le tendon.

### Dose habituelle

La dose dépendra du trouble dont vous souffrez et de sa gravité.

Une fois que votre état se sera amélioré, la dose sera réduite graduellement. Le traitement par DEPO-MEDROL avec lidocaïne ne doit pas être interrompu brusquement.

### **Surdose**

Si vous pensez qu'une personne dont vous vous occupez ou que vous-même avez reçu une trop grande quantité de DEPO-MEDROL avec lidocaïne, communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même en l'absence de symptômes.

### **Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à DEPO-MEDROL avec lidocaïne?**

Lorsque vous recevez DEPO-MEDROL avec lidocaïne, vous pourriez présenter des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés ci-dessous. Si c'est le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé.

DEPO-MEDROL avec lidocaïne peut également entraîner les effets indésirables suivants :

#### **Problèmes de peau :**

- peau mince et fragile
- œdème (enflure) du visage
- ecchymoses (bleus sur la peau causés par la rupture de petits vaisseaux sanguins)
- pétéchies (points rouges sur la peau contenant du sang)
- vergetures
- peau sèche et squameuse (qui pèle)
- éruption cutanée
- rougeur
- démangeaisons
- abcès (poche de pus)
- suppression des réactions aux tests cutanés

#### **Problèmes cardiaques :**

- rougissement du visage

#### **Troubles du système endocrinien et du métabolisme :**

- apparition d'un état cushingoïde (anomalie corporelle causée par un excès de corticostéroïdes dans l'organisme)
- faciès lunaire (visage bouffi et front bombé)
- gain de poids
- distribution anormale des graisses corporelles
- hypopituitarisme (maladie qui peut empêcher l'organisme de répondre à

diverses atteintes comme une infection ou une blessure sévères)

- arrêt de la croissance chez l'enfant
- anomalies de la croissance des poils
- perte de cheveux
- augmentation de la transpiration
- éclaircissement ou assombrissement d'une nouvelle région de la peau
- acné

#### **Troubles digestifs :**

- nausées
- vomissements ou altération du goût (lors de l'administration rapide de fortes doses)
- douleur abdominale
- ballonnements
- diarrhée
- indigestion
- augmentation de l'appétit

#### **Atteinte des os et des muscles :**

- perte de masse musculaire
- douleurs musculaires
- malaise (sensation de gêne généralisée)
- douleur et inflammation des tissus situés à proximité du point d'injection

#### **Problèmes du système nerveux :**

- maux de tête
- vertiges

- douleur et sensibilité
- troubles de la sensibilité et diminution de la force et des réflexes
- sensations cutanées anormales (picotements, chatouillements, fourmillements ou sensation de brûlure)
- sensations de chaleur, de froid ou d'engourdissement
- spasmes musculaires
- sensation de tête légère
- étourdissements
- somnolence
- bourdonnement ou tintement d'oreilles
- tremblements
- évanouissement
- amnésie
- engourdissement de la langue

#### Troubles psychiatriques :

- instabilité émotionnelle
- euphorie (bien-être, exultation, bonheur, excitation et joie intenses)

- nervosité
- sautes d'humeur
- modifications de la personnalité
- dépendance aux drogues
- manie
- délire
- schizophrénie
- comportement anormal
- irritabilité

#### Troubles de l'appareil reproducteur/troubles sexuels :

- augmentation ou diminution du nombre de spermatozoïdes et de leur mouvement

#### Autres :

- réaction au point d'injection
- hoquet
- fatigue

DEPO-MEDROL avec lidocaïne peut fausser les résultats des analyses sanguines. Votre professionnel de la santé vous fera passer des analyses sanguines au cours de votre traitement.

Effets secondaires graves et mesures à prendre			
Symptôme ou effet	Consultez votre professionnel de la santé.		Cessez de recevoir le médicament et obtenez immédiatement des soins médicaux
	Dans les cas sévères seulement	Dans tous les cas	
Coma			√
Problèmes de respiration ou arrêt de la respiration			√
Ulcères d'estomac (hémorragie ou perforation d'un ulcère) : douleur à l'estomac, saignement de l'anus, selles noires ou taches de sang dans les selles et/ou vomissement de sang			√
Réactivation de la tuberculose : toux accompagnée de crachements de sang ou douleur à la poitrine			√
Réaction allergique grave : éruption cutanée, urticaire, enflure du visage, des			√

<b>Effets secondaires graves et mesures à prendre</b>			
<b>Symptôme ou effet</b>	<b>Consultez votre professionnel de la santé.</b>		<b>Cessez de recevoir le médicament et obtenez immédiatement des soins médicaux</b>
	<b>Dans les cas sévères seulement</b>	<b>Dans tous les cas</b>	
lèvres, de la langue ou de la gorge. Difficulté à avaler ou à respirer.			
Infection : fièvre, toux ou mal de gorge persistant, douleur au moment d'uriner, douleur ou écoulement oculaire		√	
Hypertension : maux de tête ou sensation de malaise général		√	
Dysfonctionnement des intestins/de la vessie : incapacité d'arriver aux toilettes à temps, besoin d'uriner plusieurs fois au cours de la nuit		√	
Péritonite (enflure de la membrane de l'estomac) : douleur au ventre sévère qui s'aggrave quand vous bougez, mal au cœur ou vomissements, fièvre, ventre gonflé		√	
Fractures pathologiques (os brisés) : douleur, bleus et enflure au-dessus de l'os brisé		√	
Fractures par tassement des vertèbres : mal de dos soudain qui s'aggrave en position debout ou pendant la marche		√	
Rupture (déchirure) de tendon (particulièrement du tendon d'Achille) : bruit de claquement accompagné d'une douleur sévère à l'endroit de la rupture, bleus, incapacité à utiliser le membre touché		√	
Arthropathie neurogène (dite de Charcot) : enflure ou douleur de l'articulation, chaleur ou rougeur au niveau de l'articulation		√	
Inflammation du pancréas et de l'œsophage : douleur au ventre sévère, mal au cœur, vomissements; difficulté à avaler ou douleur en avalant, douleur à la poitrine, brûlures d'estomac			√
Perforation de l'intestin : douleur au ventre, ballonnements, mal au cœur ou vomissements			√

Effets secondaires graves et mesures à prendre			
Symptôme ou effet	Consultez votre professionnel de la santé.		Cessez de recevoir le médicament et obtenez immédiatement des soins médicaux
	Dans les cas sévères seulement	Dans tous les cas	
Pancréatite (inflammation du pancréas) : douleur dans le haut de l'abdomen, fièvre, battements de cœur rapides, nausées, vomissements, sensibilité de l'abdomen au toucher		√	
Augmentation de volume du foie : jaunisse (coloration jaune de la peau ou du blanc des yeux), coloration foncée de l'urine, nausées, vomissements, douleur au bas de l'abdomen		√	
Caillots sanguins : enflure, douleur ou sensibilité, habituellement dans le bras ou la jambe		√	
Insuffisance cardiaque : essoufflement, fatigue, faiblesse, vertiges, battements de cœur irréguliers			√
Ostéoporose (os minces, fragiles) : douleurs osseuses/articulaires, fractures osseuses, mal de dos qui s'aggrave en position debout ou pendant la marche			√
Crises convulsives			√
Règles irrégulières	√		
Faiblesse musculaire			√
Rétention aqueuse, gonflement		√	
Crampes et spasmes		√	
Troubles visuels : baisse de la vue, vision double, vision floue, douleur aux yeux, augmentation de la pression dans les yeux		√	
Diabète : envies plus fréquentes de boire ou d'uriner		√	
Troubles psychologiques : humeur dépressive (y compris des idées suicidaires), anxiété, insomnie		√	
Douleur aux tendons			√
Tendance à faire des ecchymoses (bleus) ou à saigner			√
Amincissement de la peau	√		
Plaies qui guérissent lentement	√		



Effets secondaires graves et mesures à prendre			
Symptôme ou effet	Consultez votre professionnel de la santé.		Cessez de recevoir le médicament et obtenez immédiatement des soins médicaux
	Dans les cas sévères seulement	Dans tous les cas	
Renouvellement anormal de la peau : taches ou nodules rouges, violets, bruns ou noirs pouvant être surélevés		√	

Si vous présentez un symptôme ou un effet secondaire incommodant qui n'est pas mentionné ici ou qui s'aggrave au point de perturber vos activités quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

#### Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer à Santé Canada les effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation des produits de santé de l'une des deux façons suivantes :

- en consultant la page Web sur la déclaration des effets secondaires (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour savoir comment faire une déclaration en ligne, par courrier ou par télécopieur; ou
- en composant le numéro sans frais 1-866-234-2345.

*REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous souhaitez obtenir des renseignements sur la prise en charge des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.*

#### Conservation

Conservez le produit entre 15 et 30 °C, à l'abri du gel. Gardez hors de la portée et de la vue des enfants.

#### Pour en savoir plus sur DEPO-MEDROL avec lidocaïne :

- Communiquez avec votre professionnel de la santé.
- Consultez la monographie intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les Renseignements destinés aux patients. Ce document est disponible sur le site Web de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html>), le site Web du fabricant (<http://www.pfizer.ca>), ou peut être obtenu en composant le 1-800-463-6001.

Le présent feuillet a été rédigé par Pfizer Canada SRI.

Dernière révision : 14 mars 2024.