

## Renseignements destinés aux patient·e·s

### LISEZ CE DOCUMENT POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

#### Pr DEPO-MEDROL AVEC LIDOCAÏNE\*

Suspension injectable d'acétate de méthyprednisolone et de chlorhydrate de lidocaïne

Ces Renseignements destinés aux patient·e·s sont rédigés pour la personne qui recevra **DEPO-MEDROL avec lidocaïne**. Il peut s'agir de vous ou d'une personne dont vous vous occupez. Lisez attentivement ces renseignements. Conservez-les, car vous devrez peut-être les relire.

Ces Renseignements destinés aux patient·e·s sont un résumé. Ils ne sont pas complets. Si vous avez des questions au sujet de ce médicament ou si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements au sujet de **DEPO-MEDROL avec lidocaïne**, adressez-vous à un professionnel de la santé.

#### À quoi sert DEPO-MEDROL avec lidocaïne :

DEPO-MEDROL avec lidocaïne est utilisé chez l'adulte en traitement complémentaire de l'inflammation aiguë des articulations ou des tendons ou de l'aggravation de l'inflammation de ces structures.

#### Comment fonctionne DEPO-MEDROL avec lidocaïne :

- DEPO-MEDROL avec lidocaïne renferme de l'acétate de méthyprednisolone et du chlorhydrate de lidocaïne.
- La méthyprednisolone fait partie d'une classe de médicaments appelés hormones corticostéroïdes. Elle diminue la réponse immunitaire de l'organisme à certaines maladies et réduit l'inflammation.
- La lidocaïne est un anesthésique local. Elle permet d'engourdir la partie du corps où elle est utilisée et réduit la douleur et l'inflammation.

#### Les ingrédients de DEPO-MEDROL avec lidocaïne sont :

Ingrédients médicinaux : acétate de méthyprednisolone et chlorhydrate de lidocaïne.

Ingrédients non médicinaux : alcool benzylique, chlorure de myristyl-gamma-picolinium, polyéthylène glycol 3350, chlorure de sodium et eau pour préparation injectable.

#### DEPO-MEDROL avec lidocaïne se présente sous la forme pharmaceutique suivante :

Suspension : acétate de méthyprednisolone dosée à 40 mg/mL et chlorhydrate de lidocaïne dosée à 10 mg/mL.

#### N'utilisez pas DEPO-MEDROL avec lidocaïne dans les cas suivants :

- vous êtes allergique :
  - à l'acétate de méthyprednisolone,
  - à n'importe quel autre stéroïde,
  - à la lidocaïne ou à n'importe quel autre anesthésique local semblable,
  - à n'importe quel autre ingrédient de DEPO-MEDROL avec lidocaïne;
- vous avez une infection fongique (causée par un champignon) ou tout autre type d'infection non traitée;
- vous avez une maladie du sang appelée purpura thrombopénique idiopathique (vous avez un nombre insuffisant de plaquettes) si DEPO-MEDROL avec lidocaïne vous est administré par injection dans un muscle;

- vous avez récemment reçu un vaccin vivant ou un vaccin vivant atténué. Ne recevez pas ce type de vaccin pendant le traitement par DEPO-MEDROL avec lidocaïne;
- vous avez une maladie virale, y compris la vaccine (variole des vaches), la varicelle (picote) et une infection de l'œil par le virus de l'herpès;
- vous avez une articulation instable, lorsque DEPO-MEDROL avec lidocaïne est injecté dans une articulation.

DEPO-MEDROL avec lidocaïne ne doit pas être injecté dans un muscle, une veine ou dans la colonne vertébrale.

DEPO-MEDROL avec lidocaïne ne doit PAS être administré aux nourrissons prématurés, car il contient de l'alcool benzylique (un agent de conservation).

**Consultez votre professionnel de la santé avant de recevoir DEPO-MEDROL avec lidocaïne, afin d'assurer l'utilisation adéquate du médicament et d'aider à éviter les effets secondaires. Informez votre professionnel de la santé de votre état actuel et de vos problèmes de santé, notamment si :**

- vous avez une infection (herpès simplex, varicelle, tuberculose, infection par un parasite [nématode]);
- vous avez eu un vaccin récemment ou vous êtes sur le point d'en avoir un;
- vous avez récemment eu des problèmes cardiaques, comme une crise de cœur, de l'insuffisance cardiaque, un trouble de la fréquence ou du rythme cardiaques ou une maladie cardiaque;
- vous avez perdu beaucoup de liquide (comme de l'eau ou du sang, à cause d'un trauma récent ou d'une déshydratation sévère);
- vous avez des problèmes de saignement ou de coagulation;
- vous avez les os fragiles (ostéoporose);
- vous faites de la haute pression (hypertension);
- vous faites de la rétention d'eau (œdème);
- vous faites de l'épilepsie, des crises convulsives, ou vous avez un autre trouble neurologique;
- vous avez des problèmes de thyroïde;
- vous ressentez une douleur ou une faiblesse musculaire (par exemple, myasthénie grave);
- vous avez une tumeur des glandes surrénales (phéochromocytome);
- vous avez une maladie de l'œil (par exemple, glaucome, cataractes ou infection par le virus de l'herpès) ou tout problème touchant la rétine;
- vous avez une maladie des reins;
- vous avez une maladie du foie (comme une cirrhose);
- vous avez un trouble psychiatrique ou un trouble de l'humeur (comme la dépression);
- vous avez des problèmes d'estomac ou d'intestins (comme un ulcère ou une colite ulcéreuse);
- vous avez un faible taux de potassium ou de calcium dans le sang;
- vous êtes atteint de la maladie de Cushing (causée par un excès de cortisol, une hormone);
- votre système immunitaire est affaibli. Informez votre professionnel de la santé si vous croyez avoir une infection, car les corticostéroïdes (comme DEPO-MEDROL avec lidocaïne) peuvent vous rendre sujet aux infections ou masquer les signes d'infection;
- vous avez le diabète ou un fort taux de sucre dans le sang;
- vous êtes atteint de sclérose systémique, une maladie causée par une production excessive par l'organisme d'une protéine appelée *collagène*;
- vous avez déjà reçu DEPO-MEDROL avec lidocaïne.

### **Autres mises en garde :**

DEPO-MEDROL avec lidocaïne peut causer des réactions graves et potentiellement mortelles. Votre professionnel de la santé vous administrera DEPO-MEDROL avec lidocaïne dans un milieu de soins où toute réaction grave pourrait être traitée immédiatement.

### **DEPO-MEDROL avec lidocaïne peut causer des effets secondaires graves, comme :**

- **Sarcome de Kaposi** (cancer de la peau) : Des cas de sarcome de Kaposi ont été signalés chez des patients traités par un corticostéroïde tel que DEPO-MEDROL avec lidocaïne. Après l'arrêt du traitement par DEPO-MEDROL avec lidocaïne, il est possible de constater des signes de disparition de ce cancer.
- **Phéochromocytome** (tumeur des glandes surrénales) : Des cas de tumeur de ce type ont été signalés chez des patients traités par un corticostéroïde tel que DEPO-MEDROL avec lidocaïne. Le phéochromocytome peut être mortel.
- **Lipomatose épidurale** (accumulation de gras sur ou à l'extérieur d'une membrane qui enveloppe la moelle épinière) : L'utilisation prolongée de fortes doses de corticostéroïdes peut causer une lipomatose épidurale.

### **Intervention chirurgicale :**

- Si vous devez subir une intervention chirurgicale, mentionnez à votre professionnel de la santé (p. ex., à votre médecin, dentiste ou anesthésiste) que vous recevez DEPO-MEDROL avec lidocaïne.

### **Grossesse et allaitement :**

- Si vous êtes enceinte, apte à concevoir et/ou allaitez, vous devez discuter de certains risques avec votre professionnel de la santé. Prendre DEPO-MEDROL avec lidocaïne peut :
  - ralentir la croissance du bébé et faire en sorte qu'il ait un faible poids à la naissance;
  - causer des cataractes chez les bébés. Ce risque est présent chez les mères qui reçoivent des corticostéroïdes pendant une grande partie de la grossesse.
- Si vous allaitez ou prévoyez allaiter, vous devriez le dire à votre professionnel de la santé, car il est possible que les médicaments à base de corticostéroïdes (comme DEPO-MEDROL avec lidocaïne) passent en petite quantité dans le lait maternel.

### **Fertilité masculine :**

Le traitement par DEPO-MEDROL avec lidocaïne peut nuire à la fertilité masculine.

### **Arrêt du traitement :**

Consultez votre professionnel de la santé avant d'arrêter de recevoir DEPO-MEDROL avec lidocaïne.

L'arrêt brusque du traitement par DEPO-MEDROL avec lidocaïne pourrait avoir les effets suivants :

- Insuffisance surrénalienne grave. Ce problème survient lorsque le corps ne produit pas assez de cortisol (une hormone). L'insuffisance surrénalienne peut être mortelle.
- Syndrome de sevrage : Ce syndrome se manifeste entre autres par les symptômes suivants : perte de l'appétit, nausées, vomissements, manque d'énergie, maux de tête, fièvre, douleur aux articulations, peau qui pèle, douleur musculaire, perte de poids et/ou hypotension (baisse de la pression sanguine).

**Système immunitaire :**

- Si vous êtes exposé à la varicelle ou à la rougeole durant le traitement par DEPO-MEDROL avec lidocaïne, communiquez avec votre professionnel de la santé immédiatement. Des effets secondaires graves, et peut-être mortels, peuvent se produire si vous n'avez pas déjà eu ces infections ou n'avez pas été immunisé/vacciné contre ces infections par le passé.
- DEPO-MEDROL avec lidocaïne peut :
  - masquer les symptômes d'une infection;
  - aggraver les symptômes d'infections existantes;
  - causer de nouvelles infections dues à une diminution de la résistance de l'organisme.

**Peau :**

- Des dépressions/trous peuvent se former au point d'injection.
- Informez votre professionnel de la santé que vous prenez DEPO-MEDROL avec lidocaïne, car ce médicament peut modifier les résultats des tests cutanés.

**Conduite et utilisation de machines :**

DEPO-MEDROL avec lidocaïne peut causer des étourdissements, des vertiges, des troubles visuels, de la fatigue ainsi que des problèmes temporaires de mobilité et de mouvement. Si vous éprouvez ces effets secondaires, il faut éviter de conduire et d'utiliser des machines.

**Mentionnez à votre professionnel de la santé toute la médication que vous prenez, y compris : médicaments, vitamines, minéraux, suppléments naturels ou produits de médecine parallèle.**

**Les produits ci-dessous pourraient interagir avec DEPO-MEDROL avec lidocaïne :**

Médicaments utilisés pour :

- traiter le glaucome et l'épilepsie, comme l'acétazolamide;
- prévenir ou traiter les nausées et les vomissements associés à une chimiothérapie administrée contre le cancer, comme l'aprépitant ou le fosaprépitant;
- traiter le cancer, comme le cyclophosphamide;
- traiter le syndrome de Cushing, le cancer du sein ou le cancer de l'ovaire (inhibiteurs de l'aromatase), comme l'aminoglutéthimide;
- « éclaircir » le sang ou empêcher la coagulation du sang (anticoagulants), comme l'acénocoumarol, le phénindione et la warfarine;
- traiter la myasthénie grave (maladie qui touche les muscles), comme la distigmine et la néostigmine;
- traiter les infections bactériennes ou fongiques (antibiotiques et antifongiques), comme le kétoconazole, l'itraconazole, l'amphotéricine B, l'érythromycine, la clarithromycine, la troléandomycine, la rifampicine et la rifabutine);
- traiter l'inflammation, comme l'aspirine, et les anti-inflammatoires non stéroïdiens (aussi appelés AINS), comme l'ibuprofène;
- traiter l'épilepsie, comme les barbituriques, la carbamazépine, le phénobarbital, la phénytoïne et la primidone;
- traiter les brûlures d'estomac et l'indigestion causée par l'hyperacidité, comme la cimétidine;
- prévenir le rejet d'organe, comme la cyclosporine et le tacrolimus;
- traiter les problèmes cardiaques ou la pression artérielle élevée, comme la digoxine et le diltiazem;

- éliminer le surplus d'eau (diurétiques);
- l'hormonothérapie substitutive ou les contraceptifs oraux à base d'hormones, comme l'éthinylestradiol et la noréthindrone;
- traiter l'infection par le VIH, comme l'indinavir ou le ritonavir;
- bloquer la transmission des signaux entre les nerfs et les muscles lors d'interventions chirurgicales (agents de blocage neuromusculaire, comme le pancuronium ou le vécuronium);
- les vaccins – si vous avez eu un vaccin récemment ou si vous êtes sur le point d'en avoir un, informez-en le professionnel de la santé;
- traiter le diabète;
- traiter la tuberculose, comme l'isoniazide;
- abaisser le taux de cholestérol, comme la cholestyramine;
- traiter la douleur et l'inflammation, comme les autres anesthésiques locaux;
- traiter les troubles du rythme cardiaque ou les battements de cœur irréguliers.

Ne mangez pas de pamplemousse et ne buvez pas de jus de pamplemousse pendant votre traitement par DEPO-MEDROL avec lidocaïne.

#### **Comment utiliser DEPO-MEDROL avec lidocaïne :**

- DEPO-MEDROL avec lidocaïne vous sera administré par votre professionnel de la santé. Il vous sera injecté dans une articulation ou un tendon (injection intra-articulaire, intrasynoviale, dans les bourses séreuses ou les tissus périarticulaires).
- Votre professionnel de la santé décidera du point d'injection, ainsi que de la dose et du nombre d'injections que vous devrez recevoir.
- Votre professionnel de la santé prescrira la dose la plus faible possible pendant la période la plus courte possible.

#### **Dose habituelle :**

La dose que vous recevrez dépendra :

- de la maladie à traiter;
- de la sévérité de celle-ci;
- de votre réponse au traitement;
- de votre exposition à un stress physique comme une infection, une opération ou une blessure.

#### **Surdose :**

Si vous pensez que vous ou une personne dont vous vous occupez avez reçu une trop grande quantité de DEPO-MEDROL avec lidocaïne, contactez immédiatement votre professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital, votre centre antipoison régional ou le numéro sans frais de Santé Canada, 1-844 POISON-X (1-844-764-7669), même en l'absence de symptômes.

#### **Effets secondaires possibles de l'utilisation de DEPO-MEDROL avec lidocaïne :**

Voici certains des effets secondaires que vous pourriez ressentir lorsque vous recevez DEPO-MEDROL avec lidocaïne. Si vous ressentez des effets secondaires qui ne font pas partie de cette liste, avisez votre professionnel de la santé.

DEPO-MEDROL avec lidocaïne peut entraîner les effets secondaires suivants :

- rougissement du visage;

- problèmes de peau tels que points rougeâtres contenant du sang qui apparaissent dans la peau, bosses rougeâtres ou sensibles sur la peau, acné, éruption cutanée, rougeur, démangeaisons, peau sèche et squameuse (qui pèle), augmentation de la transpiration, éclaircissement ou assombrissement d'une région de la peau, abcès (poche de pus), perte de cheveux et vergetures;
- anomalies de la croissance des poils;
- problèmes gastro-intestinaux tels que nausées, vomissements, diarrhée, altération du goût, douleur abdominale, ballonnements, anomalie de l'appétit et indigestion;
- perte de masse musculaire et faiblesse musculaire;
- crampes et spasmes musculaires;
- problèmes du système nerveux (y compris inflammation et atteinte des nerfs) tels que maux de tête, douleur, sensibilité, troubles de la sensibilité et diminution de la force et des réflexes, sensations de chaleur, de froid ou d'engourdissement, sensations cutanées anormales (picotements, chatouillements, fourmillements ou sensation de brûlure), vertiges, étourdissements, tendance à oublier, contractions musculaires, somnolence, bourdonnement ou tintement d'oreilles et tremblements;
- comportement anormal tel qu'anxiété, nervosité, confusion, euphorie (bien-être, exultation, bonheur, excitation et joie intenses), modifications de la personnalité, irritabilité, sautes d'humeur/instabilité émotionnelle, humeur exaltée (manie), dépendance aux drogues et difficulté à dormir;
- menstruations irrégulières;
- perte de mémoire.

Comme DEPO-MEDROL avec lidocaïne peut fausser les résultats des analyses sanguines, votre professionnel de la santé déterminera quand se feront les prises de sang et en interprétera les résultats.

#### Effets secondaires graves et mesures à prendre à leur égard

Fréquence/effet secondaire/symptôme	Consultez votre professionnel de la santé		Cessez d'utiliser le médicament et obtenez immédiatement de l'aide médicale
	Dans les cas sévères seulement	Dans tous les cas	
<b>Inconnue</b>			
<b>Tension artérielle anormale (haute ou basse) :</b> maux de tête, étourdissements, évanouissement, sensation de vertige, vision trouble, nausées, vomissements, fatigue (pouvant survenir quand vous passez de la position couchée ou assise à la position debout), accélération du rythme cardiaque ou palpitations cardiaques		√	
<b>Réactions allergiques :</b> éruption cutanée, urticaire, enflure du visage, des			√

Fréquence/effet secondaire/symptôme	Consultez votre professionnel de la santé		Cessez d'utiliser le médicament et obtenez immédiatement de l'aide médicale
	Dans les cas sévères seulement	Dans tous les cas	
lèvres, de la langue ou de la gorge, démangeaisons, difficulté à avaler, difficulté à respirer, chute de la tension artérielle, étourdissements, évanouissement, respiration sifflante, nausées ou vomissements			
<b>Arythmie</b> (anomalies du rythme cardiaque) : battements de cœur rapides, lents, forts ou irréguliers		√	
<b>Nécrose aseptique</b> (mort de tissus) : douleur qui s'intensifie ou persiste, amplitude de mouvement limitée dans une articulation ou un membre, douleur, enflure, sensibilité, faiblesse ou raideur articulaire			√
<b>Problèmes de vessie</b> : incapacité d'arriver aux toilettes à temps ou besoin d'uriner plusieurs fois au cours de la nuit		√	
<b>Saignements, mauvaise cicatrisation des plaies</b>	√		
<b>Caillots de sang</b> : enflure, douleur ou sensibilité, habituellement dans un bras ou une jambe, picotements, engourdissements, pâleur de la peau, douleur musculaire ou spasmes musculaires			√
<b>Problèmes de respiration ou arrêt de la respiration</b>			√
<b>Arrêt cardiaque</b> (arrêt soudain des battements du cœur) : fatigue, perte de conscience, étourdissements, nausées, douleur à la poitrine, essoufflement ou battements de cœur très forts			√
<b>Arthropathie neurogène (dite de Charcot)</b> (troubles du pied ou de la cheville liés à des problèmes nerveux) : enflure de l'articulation, douleur au pied, ou chaleur ou rougeur au niveau de l'articulation		√	
<b>Coma</b> (perte profonde de conscience)			√
<b>Syndrome cushingoïde</b> (taux accrus de cortisol) : prise de poids, visage bouffi	√		

Fréquence/effet secondaire/symptôme	Consultez votre professionnel de la santé		Cessez d'utiliser le médicament et obtenez immédiatement de l'aide médicale
	Dans les cas sévères seulement	Dans tous les cas	
(« face de lune »), peau mince et fragile, tendance aux ecchymoses (bleus), fatigue, maux de tête ou muscles faibles			
<b>Dépression</b> (tristesse persistante) : difficulté à dormir, sommeil excessif, changements de l'appétit ou du poids, sentiments de dévalorisation, de culpabilité, de regret, d'impuissance ou de désespoir, évitement des situations sociales, de la famille, des rassemblements et des activités avec des amis, baisse de la libido (désir sexuel)	√		
<b>Diabète</b> (taux élevé de sucre dans le sang) ou <b>baisse de la tolérance au sucre</b> : augmentation de la soif, envies plus fréquentes d'uriner, augmentation de l'appétit ou vision trouble		√	
<b>Œdème</b> (enflure ou rétention de liquide) : enflure inhabituelle des bras, des mains, des jambes, des pieds et chevilles, du visage ou des voies aériennes		√	
<b>Lipomatose épidurale</b> (accumulation de graisses autour de la moelle épinière) : douleur au dos, faiblesse, perte de sensation, reflexes trop lents ou trop rapides		√	
<b>Troubles oculaires incluant cataractes</b> : rétine déplacée de sa position normale, vision double, vision trouble, douleur aux yeux, augmentation de la pression dans les yeux, cécité touchant l'un des yeux ou les deux, ou yeux exorbités			√
<b>Réactivation de la tuberculose</b> : toux qui persiste, fièvre, perte de poids, crachats de sang ou douleur dans la poitrine			√
<b>Fractures</b> (os brisés) : douleur, bleus et enflure au-dessus de l'os brisé, ou douleur soudaine qui s'aggrave pendant la marche ou en position debout		√	

Fréquence/effet secondaire/symptôme	Consultez votre professionnel de la santé		Cessez d'utiliser le médicament et obtenez immédiatement de l'aide médicale
	Dans les cas sévères seulement	Dans tous les cas	
<b>Crise cardiaque</b> : sensation douloureuse de pression ou de serrement entre les omoplates, dans la poitrine, la mâchoire, le bras gauche ou le haut de l'abdomen, essoufflement, étourdissements, fatigue, sensation de vertige, peau moite, transpiration, indigestion, anxiété, sensation de faiblesse ou battements de cœur irréguliers			√
<b>Insuffisance cardiaque</b> : étourdissements, fatigue, faiblesse, essoufflement, évanouissement, fréquence cardiaque irrégulière ou battements de cœur rapides et forts			√
<b>Augmentation de la pression intracrânienne</b> (pression à l'intérieur du crâne avec enflure)			√
<b>Infections</b> : symptômes d'aggravation d'une infection existante, réactivation d'une infection qui couvait, fièvre persistante, toux, sensation de malaise, mal de gorge, douleur au moment d'uriner, douleur oculaire, écoulement oculaire			√
<b>Infections/réactions au point d'injection</b> : formation de cloques, douleur, modifications de la peau ou dépressions (creux) sur la peau, sensibilité, chaleur autour du point d'injection ou inflammation	√		
<b>Sarcome de Kaposi</b> (cancer qui cause la formation de tumeurs dans les vaisseaux sanguins et la peau) : bosses ou taches légèrement surélevées de couleur mauve, rose, brune, noire, bleue ou rouge qui apparaissent n'importe où sur la peau ou dans la bouche et/ou la gorge			√
<b>Troubles du foie comprenant des lésions hépatiques et une hépatite</b> (inflammation du foie) : coloration jaune de la peau ou du blanc des yeux, coloration foncée de l'urine, nausées,		√	

Fréquence/effet secondaire/symptôme	Consultez votre professionnel de la santé		Cessez d'utiliser le médicament et obtenez immédiatement de l'aide médicale
	Dans les cas sévères seulement	Dans tous les cas	
vomissements, douleur au bas de l'abdomen, fatigue, fièvre, selles pâles ou fatigue inhabituelle			
<b>Méningite</b> (infection des membranes qui entourent le cerveau et la moelle épinière) : fièvre, nausées, vomissements, maux de tête, raideur de la nuque, extrême sensibilité à la lumière vive, confusion, convulsions, somnolence, difficulté à se réveiller, absence d'appétit ou de soif, ou éruption cutanée			√
<b>Acidose métabolique</b> (taux élevé d'acide dans le sang) : fatigue, douleur abdominale, confusion, étourdissements, perte d'appétit, maux de tête, nausées, vomissements, faiblesse ou accélération de la fréquence cardiaque			√
<b>Ostéoporose</b> (os minces, fragiles) : os brisés, douleurs articulaires, douleurs osseuses ou mal de dos qui s'aggrave en position debout ou pendant la marche			√
<b>Pancréatite ou œsophagite</b> (inflammation du pancréas ou de l'œsophage) : douleur abdominale, nausées, vomissements, difficulté à avaler ou douleur en avalant, brûlures d'estomac, fièvre, battements de cœur rapides ou sensibilité de l'abdomen au toucher			√
<b>Perforation de l'intestin</b> (trou dans l'intestin) : douleur abdominale, ballonnements, nausées, vomissements, frissons ou fièvre			√
<b>Péritonite</b> (inflammation de la membrane de l'estomac) : douleur abdominale sévère qui s'aggrave quand vous bougez, mal au cœur ou vomissements, fièvre ou ventre gonflé			√
<b>Phéochromocytome</b> (tumeur des glandes surrénales) : tension artérielle			√

Fréquence/effet secondaire/symptôme	Consultez votre professionnel de la santé		Cessez d'utiliser le médicament et obtenez immédiatement de l'aide médicale
	Dans les cas sévères seulement	Dans tous les cas	
élevée, transpiration, battements de cœur rapides, pâleur ou maux de tête			
<b>Rhabdomyolyse</b> (destruction de tissu musculaire endommagé) : douleur musculaire sans cause apparente, sensibilité ou faiblesse musculaire, urine foncée		√	
<b>Schizophrénie ou aggravation de la schizophrénie</b> : hallucinations (sentir, voir ou entendre des choses qui n'existent pas), délire, pensée désorganisée ou incohérente, sentiment de persécution, de méfiance ou de peur		√	
<b>Convulsions</b> (crises convulsives) : perte de conscience accompagnée de tremblements incontrôlables			√
<b>Cancer de la peau</b> (renouvellement anormal de la peau) : nodules sur la peau pouvant être rouges, violets, bruns ou noirs et pouvant être surélevés		√	
<b>Ulcères d'estomac</b> (hémorragie ou perforation d'un ulcère) : douleur à l'estomac, saignement de l'anus, selles noires ou teintées de sang, vomissement de sang, perte d'appétit ou perte de poids			√
<b>Pensées ou comportements suicidaires</b>			√
<b>Suppression de l'axe hypothalamo-hypophysio-surrénalien</b> : (réponses inadéquates de l'organisme au stress naturel) : fatigue, dépression et anxiété, difficulté à dormir, faiblesse ou perte de masse musculaire		√	
<b>Rupture de tendon</b> (particulièrement du tendon d'Achille) : bruit de claquement accompagné d'une douleur sévère à l'endroit de la rupture, bleus, ou incapacité à utiliser le membre touché			√
<b>Amincissement de la peau, peau fragile</b>	√		
<b>Syndrome de lyse tumorale</b> (mort soudaine et rapide des cellules cancéreuses à cause du traitement) :			√

Fréquence/effet secondaire/symptôme	Consultez votre professionnel de la santé		Cessez d'utiliser le médicament et obtenez immédiatement de l'aide médicale
	Dans les cas sévères seulement	Dans tous les cas	
insuffisance rénale et problèmes cardiaques mettant la vie en danger, nausées, essoufflement, battements de cœur irréguliers, troubles du rythme cardiaque, absence de mictions, urines troubles, spasmes musculaires, contractions musculaires, fatigue, douleur articulaire, faiblesse musculaire sévère ou crises convulsives			

En cas de symptôme ou d'effet secondaire gênant non mentionné dans le présent document ou d'aggravation d'un symptôme ou d'un effet secondaire vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes, parlez à votre professionnel de la santé.

#### Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer à Santé Canada des effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation des produits de santé de l'une des deux façons suivantes :

- En consultant la page Web sur la déclaration des effets indésirables ([Canada.ca/medicament-instrument-declaration](http://Canada.ca/medicament-instrument-declaration)) pour savoir comment faire une déclaration en ligne, par courrier ou par télécopieur; ou
- En téléphonant sans frais au 1-866-234-2345.

*REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous souhaitez obtenir des renseignements sur la prise en charge des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.*

#### Conservation :

Conservez le produit entre 15 et 30 °C, à l'abri du gel. Gardez hors de la portée et de la vue des enfants.

#### Pour en savoir plus sur DEPO-MEDROL avec lidocaïne :

- Parlez-en avec votre professionnel de la santé.
- Consultez la monographie intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les Renseignements destinés aux patient·e·s. Ce document se trouve sur le site Web de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html>) et sur le site Web du fabricant (<http://www.pfizer.ca>) ou peut être obtenu en téléphonant au 1-800-463-6001.

Le présent feuillet a été rédigé par Pfizer Canada SRI.

Date d'approbation : 2025-07-04