

RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PATIENTS

LISEZ CE DOCUMENT POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

PrIsétionate de pentamidine pour injection BP

Isétionate de pentamidine

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à recevoir **Isétionate de pentamidine pour injection BP** et chaque fois que votre ordonnance est renouvelée. Ce feuillet est un résumé et il ne contient donc pas tous les renseignements pertinents au sujet de ce produit. Discutez avec votre professionnel de la santé de votre maladie et de votre traitement et demandez-lui si de nouveaux renseignements sur **Isétionate de pentamidine pour injection BP** sont disponibles.

Mises en garde et précautions importantes

- **Ce médicament peut causer des réactions graves pouvant parfois entraîner la mort, y compris :**
 - tension artérielle très basse, même après une seule dose
 - taux de sucre sanguin très bas
 - battements cardiaques irréguliers
 - inflammation du pancréas
 - fuite du médicament hors de la veine, pouvant entraîner :
 - irritation des tissus et plaies
 - mort cellulaire
 - autres complications

- **Votre médecin utilisera ce produit uniquement à l'hôpital, où il pourra surveiller :**
 - le taux de sucre sanguin
 - l'hémogramme (nombre de cellules du sang)
 - le fonctionnement des reins et du foie
 - la fréquence cardiaque

- **Avant de décider si ce traitement vous convient, votre médecin tiendra compte d'autres problèmes que vous pourriez présenter, notamment :**
 - tension artérielle élevée ou basse
 - taux de sucre sanguin élevé ou bas
 - baisse du nombre de globules blancs, de globules rouges ou de plaquettes
 - problèmes au foie ou aux reins

Pourquoi utilise-t-on Isétionate de pentamidine pour injection BP?

Isétionate de pentamidine pour injection BP est un médicament qui sert à traiter une infection aux poumons (pneumonie).

Comment Isétionate de pentamidine pour injection BP agit-il?

Isétionate de pentamidine pour injection BP empêche les bactéries responsables de votre infection de se multiplier et entraîne leur mort.

Quels sont les ingrédients d'Isétionate de pentamidine pour injection BP?

Ingrédient médicamenteux : isétionate de pentamidine.

Ingrédients non médicamenteux : La préparation ne contient aucun ingrédient non médicamenteux.

Isétionate de pentamidine pour injection BP se présente sous la forme pharmaceutique suivante :

Poudre pour solution : 300 mg/flacon

N'utilisez pas Isétionate de pentamidine pour injection BP dans les cas suivants :

- si vous présentez une hypersensibilité au médicament ou à l'une des parties du contenant.

Consultez votre professionnel de la santé avant de recevoir Isétionate de pentamidine pour injection BP, afin d'aider à éviter les effets secondaires et assurer la bonne utilisation du médicament.

Informez votre professionnel de la santé de tous vos problèmes et états de santé, notamment si :

- vous avez des problèmes de foie, de pancréas ou de rein;
- vous souffrez de haute pression (hypertension) ou de basse pression (hypotension);
- la quantité de sucre dans votre sang est trop basse (hypoglycémie) ou trop élevée (hyperglycémie);
- le nombre de vos globules blancs est faible (leucopénie);
- le nombre de vos globules rouges est faible (anémie);
- le nombre de vos plaquettes est faible (thrombocytopénie);
- votre taux sérique de calcium est faible (hypocalcémie);
- votre fréquence cardiaque ou votre rythme cardiaque sont irréguliers;
- vous êtes enceinte ou planifiez une grossesse;
- vous allaitez ou avez l'intention d'allaiter.

Mentionnez à votre professionnel de la santé tous les médicaments et produits de santé que vous prenez, y compris : médicaments d'ordonnance et en vente libre, vitamines, minéraux, suppléments naturels et produits de médecine douce.

Les produits ci-dessous pourraient interagir avec Isétionate de pentamidine pour injection BP :

- Médicaments susceptibles d'être toxiques pour les reins :
 - Aminosides
 - Amphotéricine B
 - Cisplatine
 - Méthoxyfluorane
 - Vancomycine
- Les médicaments susceptibles d'être dangereux pour le foie ou les cellules du sang.

Comment Isétionate de pentamidine pour injection BP s'administre-t-il?

Un médecin ou un professionnel de la santé se chargera de préparer Isétionate de pentamidine pour injection BP et de vous l'administrer. Ce médicament peut vous être administré dans une veine de la main ou du bras, ou être injecté dans un muscle de votre cuisse ou de vos fesses.

Dose habituelle chez l'adulte

La posologie habituelle est de 4 mg/kg 1 fois par jour pendant 14 à 21 jours; elle peut toutefois varier selon la décision de votre médecin. Il se peut que votre médecin vous prescrive des analyses de sang avant, pendant et après le traitement.

Surdose

Si vous pensez qu'une personne dont vous vous occupez ou que vous-même avez reçu une trop grande quantité d'Isétionate de pentamidine pour injection BP, communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même en l'absence de symptômes.

Dose omise

Si vous avez oublié de prendre une dose, communiquez avec votre médecin pour savoir quoi faire.

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à Isétionate de pentamidine pour injection BP?

Comme tous les médicaments, Isétionate de pentamidine pour injection BP peut produire des effets secondaires. Si c'est le cas, ces effets seront probablement mineurs et passagers. Cependant, certains effets peuvent être plus graves et nécessiter une intervention médicale.

Lorsque vous prenez ou recevez Isétionate de pentamidine pour injection BP, vous pourriez présenter des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés ci-dessous. Si c'est le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé. Consultez également la section Mises en garde et précautions importantes ci-dessus.

Les effets secondaires les plus fréquents sont les suivants :

- Réactions locales au point d'injection (douleur, gonflement et accumulation de pus, changements dans la couleur ou l'apparence de la peau)
- Faible quantité de folates dans le sang
- Faible taux sanguin de calcium (hypocalcémie)
- Faible nombre de globules rouges (anémie)
- Faible nombre de plaquettes dans le sang (thrombocytopenie)
- Résultats anormaux aux analyses sanguines permettant de vérifier le fonctionnement du foie
- Nausées
- Vomissements
- Rougeur de la peau (bouffées vasomotrices)
- Goût déplaisant
- Éruption cutanée, démangeaisons
- Douleur ou sensibilité au point d'injection

Les effets indésirables moins courants sont :

- Grande quantité de sucre dans le sang (hyperglycémie)
- Grande quantité d'azote uréique dans le sang ou de créatinine dans le sérum sanguin
- Grande quantité de potassium dans le sang (hyperkaliémie)
- Grande quantité d'albumine dans l'urine (albuminurie)
- Grande quantité de glucose dans l'urine (glycosurie)
- Points rouges sur la peau (érythème polymorphe)
- Étourdissements
- Évanouissement (ou perte de conscience)
- Alopécie (chute de cheveux)
- Hallucinations
- Caillot sanguin dans une veine
- Mort

Effets secondaires graves et mesures à prendre			
Symptôme ou effet	Consultez votre professionnel de la santé		Cessez de recevoir le médicament et obtenez immédiatement des soins médicaux
	Dans les cas sévères seulement	Dans tous les cas	
TRÈS FRÉQUENT			
Problèmes de rein, diminution de la quantité d'urine produite, modification de la couleur de l'urine			√
Tension artérielle basse			√
FRÉQUENT			
Faible quantité de sucre dans le sang			√
Faible nombre de globules blancs (moins de 1 000/mm ³), faible nombre de plaquettes (moins de 20 000/mm ³)			√
Faible quantité de calcium dans le sérum sanguin			√
RARE			
Inflammation aiguë du pancréas			√
Fréquence ou rythme cardiaques irréguliers (problème de santé appelé « allongement de l'intervalle QT » et/ou torsades de pointes)			√

Si vous présentez un symptôme ou un effet secondaire incommodant qui n'est pas mentionné ici ou qui s'aggrave au point de perturber vos activités quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer à Santé Canada les effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation des produits de santé de l'une des deux façons suivantes :

- en consultant la page Web sur la déclaration des effets secondaires <https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour savoir comment faire une déclaration en ligne, par courriel ou par télécopieur; ou
- en composant le numéro sans frais 1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous souhaitez obtenir des renseignements sur la prise en charge des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

Conservation

Votre professionnel de la santé conservera le médicament conformément aux renseignements destinés aux professionnels de la santé sur le produit.

Gardez hors de la portée et de la vue des enfants.

Pour en savoir plus sur Isétionate de pentamidine pour injection BP :

- Communiquez avec votre professionnel de la santé.
- Consultez la monographie intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les Renseignements destinés aux patients. Ce document est disponible sur le site Web de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html>), le site Web du fabricant, <https://www.pfizer.ca/>, ou peut être obtenu en composant le 1-800-463-6001.

Le présent feuillet a été rédigé par Pfizer Canada SRI.

Dernière révision : 31 janvier 2022.