





Πίνακας 1. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων, 2023*

Εμβόλιο ▼		Ηλικία															
		Γέννηση	1 μηνός	2 μηνών	4 μηνών	6 μηνών	12 μηνών	15 μηνών	18 μηνών	19-23 μηνών	2-3 ετών	4-6 ετών	7-8 ετών	9-10 ετών	11-12 ετών	13-14 ετών	15-18 ετών
Ηπατίτιδας Β (HepB) ¹	- Εναρξη στη γέννηση	HepB	HepB	HepB	HepB, 3 ή 4 ¹ δόσεις συνολικά				HepB								
	- Εναρξη αργότερα		HepB	HepB	HepB, 3 δόσεις συνολικά				HepB								
Διφθερίτιδας, Τετάνου, ακυτταρικό Κοκκύτη (DTaP <7 ετών, Tdap ≥7)			DTaP	DTaP	DTaP	DTaP	DTaP	DTaP	DTaP	DTaP	DTaP	Tdap ή Tdap-IPV	Tdap ή Tdap-IPV	Tdap ή Tdap-IPV	Tdap ή Tdap-IPV	Tdap ή Tdap-IPV	
Πολιομυελίτιδας αδρανοποιημένο (IPV) ³			IPV	IPV	IPV				IPV	IPV	IPV		Tdap ή Tdap-IPV	Tdap ή Tdap-IPV	Tdap ή Tdap-IPV	Tdap ή Tdap-IPV	
Αιμόφιλου ινφλουέντζας τύπου b (Hib) ⁴			Hib	Hib	Hib	Hib	Hib	Hib	Hib	Hib	Hib		Hib				
Πνευμονιόκοκκου συζευγμένο (PCV) ⁵			PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV					
Πνευμονιόκοκκου πολυσακχαριδικό (PPSV23) ⁶												PPSV23					
Μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδας C συζευγμένο (MCC) ⁷						MCC 1 δόση	MCC, 1 δόση										
Μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδων A,C,W135,Y συζευγμένο			Men ACW	Men ACW		MenACWY, 1 δόση						MenACWY	MenACWY 1 δόση				
Μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδας B πρωτεϊνικό (MenB-4C ή MenB-fHbp) ⁸			MenB-4C						MenB-4C ή MenB-fHbp								
Παράς, Παρωτίτιδας, Ερυθράς (MMR) ⁹						MMR 1 ^η δόση	MMR	MMR 2 ^η δόση	MMR	MMR	MMR	MMR	MMR	MMR	MMR	MMR	
Ανεμευλογιάς (VAR) ¹⁰						VAR 1 ^η δόση	VAR	VAR 2 ^η δόση	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	
Ηπατίτιδας Α (HepA) ¹¹								HepA 2 δόσεις	HepA	HepA	HepA	HepA	HepA	HepA	HepA	HepA	
Ιού ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) ¹²													HPV 2 δόσεις	HPV 2 δόσεις	HPV 3 δόσεις	HPV 3 δόσεις	
Φυματίωσης (BCG) ¹³		BCG															
Γρίπης ¹⁴						Ετησίως σε ομάδες αυξημένου κινδύνου											
Ρότα ιού (RV1 ή RV5) ¹⁵				RV1 ή RV5	RV1 ή RV5	RV5											

* Τα πολυδύναμα εμβόλια πρέπει να προτιμώνται των ολιγοδύναμων.

-  Συστήνονται για όλα τα άτομα με την ανάλογη ηλικία που δεν έχουν ένδειξη ανοσίας.
-  Συστήνονται σε άτομα που καθυστέρησαν να εμβολιαστούν.
-  Συστήνονται σε άτομα που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου (βλέπε ομάδες αυξημένου κινδύνου).
-  Δεν συστήνονται.