

tivdak[®]
tisotumab vedotin-tftv
inyectable de 40 mg

Para cuidadores

¿Cuida a alguien que toma Tivdak?

Ahora vamos a cuidarlo a usted.

No es un paciente o cuidador real.

¿Qué es TIVDAK?

TIVDAK es un medicamento recetado que se usa para tratar a adultas con cáncer de cuello uterino:

- que ha regresado o se ha extendido a otras partes del cuerpo, **y**
- quienes han recibido quimioterapia que no funcionó o ya no funciona.

Información de seguridad importante

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre TIVDAK?

Los problemas oculares son frecuentes con TIVDAK y pueden ser graves. TIVDAK puede causar cambios en la superficie del ojo que pueden provocar sequedad, enrojecimiento, irritación, úlceras corneales, visión borrosa y pérdida grave de la visión. **Informe a su proveedor de atención médica si desarrolla cambios en la visión o problemas oculares nuevos o que empeoran durante el tratamiento.**

Su proveedor de atención médica lo enviará a un especialista de la vista para que le revise los ojos antes de comenzar el tratamiento con TIVDAK, antes de cada infusión durante sus primeras 9 infusiones de TIVDAK y, según sea necesario, a fin de detectar cualquier signo o síntoma de problemas oculares nuevo o que empeore. Su proveedor de atención médica le preguntará si tiene algún signo o síntoma de problemas oculares antes de cada infusión. Lo derivarán a un especialista de la vista si detecta signos o síntomas nuevos o que empeoran de problemas oculares.

Continúe leyendo la información sobre problemas oculares en la página 2.

Consulte la [Información de seguridad importante](#) adicional en las páginas 2 y 3, y lea la sección [Datos importantes](#) sobre TIVDAK, incluida la **ADVERTENCIA IMPORTANTE** para problemas oculares, al final de este documento.

Información de seguridad importante (cont.)

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre TIVDAK? (cont.)

Su proveedor de atención médica le recetará 3 tipos diferentes de gotas para los ojos antes de comenzar el tratamiento con TIVDAK. **Lleve consigo las gotas para los ojos a cada infusión y úselas según las indicaciones de su proveedor de atención médica para reducir el riesgo de problemas oculares:**

- Use 1 gota para los ojos con esteroides en cada ojo antes de cada infusión y continúe usando las gotas para los ojos 3 veces al día durante 3 días después de cada infusión.
- Use gotas vasoconstrictoras para los ojos justo antes de cada infusión.
- Use gotas lubricantes para los ojos durante todo el tratamiento y 30 días después de su última dosis de TIVDAK.

No use lentes de contacto durante su tratamiento con TIVDAK, a menos que se lo indique su especialista de la vista.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de TIVDAK?

Los efectos secundarios graves de TIVDAK pueden incluir los siguientes:

Problemas oculares. Consulte “¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre TIVDAK?”

Los problemas nerviosos (neuropatía periférica) son frecuentes con TIVDAK y pueden ser graves. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene entumecimiento u hormigueo nuevos o que empeoran en manos o pies, o debilidad muscular.

Los problemas de sangrado (hemorragia) son frecuentes con TIVDAK y pueden ser graves. Informe a su proveedor de atención médica o busque ayuda médica de inmediato si tiene signos o síntomas de sangrado durante el tratamiento con TIVDAK,

incluidos sangre en las heces o heces negras (que se parecen al alquitrán), sangre en la orina, tos o vómitos con sangre, sangrado vaginal inusual o cualquier sangrado inusual o abundante.

Problemas pulmonares. TIVDAK puede causar una inflamación de los pulmones grave o potencialmente mortal que puede provocar la muerte. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene síntomas nuevos o que empeoran, como dificultad para respirar, falta de aire o tos.

Reacciones cutáneas graves. TIVDAK puede causar reacciones cutáneas graves o potencialmente mortales que pueden provocar la muerte. Informe a su proveedor de atención médica u obtenga ayuda médica de inmediato si tiene signos o síntomas de una reacción cutánea grave durante el tratamiento con TIVDAK, entre los que se incluyen los siguientes:

- Reacciones cutáneas que parecen anillos (lesiones diana)
- Sarpullido o picazón que continúa empeorando
- Ampollas o descamación de la piel
- Llagas o úlceras dolorosas en la boca, nariz, garganta o área genital
- Fiebre o síntomas similares a los de la gripe
- Ganglios linfáticos inflamados

Los efectos secundarios más comunes de TIVDAK incluyen los siguientes:

- Disminución del recuento de glóbulos rojos
- Entumecimiento u hormigueo en manos o pies
- Problemas oculares (trastornos conjuntivales)
- Náuseas
- Cansancio
- Cambios en los análisis de sangre de la función hepática
- Hemorragia nasal
- Pérdida de cabello (alopecia)
- Sangrado (hemorragia)

Su proveedor de atención médica puede disminuir su dosis de TIVDAK, suspender de manera temporal o por completo el tratamiento si tiene efectos secundarios.

Información de seguridad importante (cont.)

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de recibir TIVDAK?

Informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso ante las siguientes situaciones:

- antecedentes de problemas de visión u oculares
- entumecimiento u hormigueo en manos o pies
- trastornos hemorrágicos
- problemas hepáticos
- embarazo o planes de quedar embarazada; TIVDAK puede dañar al feto. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si queda embarazada o cree que podría estarlo durante el tratamiento con TIVDAK.
- está amamantando (lactancia) o planea amamantar. Se desconoce si TIVDAK pasa a la leche materna. No amamante durante el tratamiento y al menos 3 semanas después de la última dosis de TIVDAK.

Mujeres que pueden quedar embarazadas:

- Su proveedor de atención médica debe realizarle una prueba de embarazo antes de comenzar el tratamiento con TIVDAK.
- Utilice un método anticonceptivo eficaz durante su tratamiento y al menos 2 meses después de la última dosis de TIVDAK.

Hombres con parejas femeninas que pueden quedar embarazadas:

- Utilice un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y 4 meses después de la última dosis de TIVDAK.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. Tomar TIVDAK con algunos otros medicamentos puede causar efectos secundarios.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de TIVDAK. Consulte los efectos secundarios con su proveedor de atención médica. Puede informar efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088.

Consulte la [información de prescripción completa](#) con la [Guía de medicamentos](#) sobre TIVDAK, incluida una **ADVERTENCIA IMPORTANTE**.

Cuidar a otra persona es parte de la experiencia humana.

Como ya sabrá, cuidar a un ser querido con un problema de salud puede tener sus dificultades. Si bien a veces es un desafío, cuidar a un ser querido a quien le han recetado Tivdak es un trabajo único y especial.

Como cuidador hay pasos que puede seguir para asegurarse de que usted y su ser querido se sientan apoyados.

/ Esta guía le servirá de **ayuda**



No es un paciente o cuidador real.

/ Siempre recuerde: **cuídese**

No puede cuidar de otra persona si no se cuida a usted mismo.
Aquí tiene algunos consejos útiles.

Busque apoyo. Es importante crear un sistema de apoyo con el que pueda contar. ¡No está solo en esto!

Tome descansos. Ser cuidador es un trabajo duro

Pida ayuda cuando sea necesario y esté abierto a compartir sus responsabilidades con los demás

Lleve un registro de sus propios estados de ánimo. Si no se siente bien, busque ayuda

Aprenda a comunicarse mejor con el equipo de atención

Esté abierto a las nuevas tecnologías que pueden ayudarlo a cuidar a su ser querido

Tome descansos.

Cuidar a un ser querido además de las tareas diarias no es fácil

No es un paciente o cuidador real.

/ Comprender el **Tivdak**

A su ser querido le han recetado Tivdak.

¿Y ahora qué?

En primer lugar es importante comprender que Tivdak no es como la quimioterapia tradicional que su ser querido pudo haber recibido antes para su cáncer de cuello uterino.

Tenga en cuenta que existen posibles efectos secundarios con Tivdak; uno de ellos son los problemas oculares. Por esta razón es muy importante ayudar a su ser querido a tomar medidas para reducir el riesgo de problemas oculares.



No es un paciente o cuidador real.



El equipo de atención está disponible para ayudar.

Hable con ellos para comprender y ayudar a identificar los posibles efectos secundarios que su ser querido pueda experimentar.

Hablaremos más sobre qué buscar y cómo puede ayudar a su ser querido si experimenta efectos secundarios más adelante en esta guía.

/ Cuidado ocular

Los exámenes oculares

Una vez que a su ser querido le hayan recetado Tivdak, lo enviarán a un especialista de la vista. El especialista de la vista le revisará los ojos antes de iniciar el tratamiento. Se realizarán exámenes similares antes de cada una de sus primeras 9 infusiones de Tivdak y según sea necesario. Esto es para detectar signos o síntomas nuevos o que empeoran de problemas oculares.

¿Cómo puede ayudar?

Esta lista de verificación puede ayudarlos a usted y a su ser querido a prepararse para exámenes oculares y otras citas

✓ **Lleve un registro**

Anote todas las citas, efectos secundarios y consejos médicos del equipo de atención

✓ **Prepare una lista de preguntas**

Cree una lista de preguntas para hacerle al equipo de atención de su ser querido antes de cada cita

✓ **Organice sus documentos**

Asegúrese de que todos los documentos importantes estén actualizados y sean fáciles de encontrar

✓ **Traiga una lista de medicamentos con usted**

Registre todos los medicamentos que toma su ser querido

Se requiere un examen ocular antes de la prescripción inicial de gotas para los ojos con esteroides y antes de cada renovación de la receta.

Las gotas para los ojos

El oncólogo u especialista de la vista le recetarán 3 tipos diferentes de gotas para los ojos. Estas gotas se utilizarán en diferentes puntos durante el tratamiento.

- Gotas con esteroides
- Gotas vasoconstrictoras
- Gotas lubricantes

¿Cómo puede ayudar?

Ayude a su ser querido a mantenerse al tanto de sus horarios de las infusiones y las gotas para los ojos

/ **El rastreador de gotas para los ojos,**

ubicado en el **Folleto para pacientes**, puede ayudar a su ser querido a mantenerse al tanto de su calendario de gotas para los ojos

/ **TivdakTexts** puede ayudarlos a usted y

a su ser querido a recordar los horarios de las infusiones y de la aplicación de las gotas para los ojos

Obtenga más información en tivdak.com/resources-and-support

/ La infusión

La cita para la infusión

Tivdak se administra en forma de infusión una vez cada 3 semanas. El médico trabajará con su ser querido para decidir cuántas infusiones necesitará. El equipo de atención también puede ayudar a su ser querido a aplicarse algunas gotas para los ojos y compresas frías durante el proceso de infusión.

¿Cómo puede ayudar?



Recuerde a su ser querido que traiga **las 3 gotas para los ojos a la cita de infusión**



Deben **evitar los lentes de contacto** una vez que comience el tratamiento con Tivdak, a menos que el especialista de la vista indique lo contrario



Deben **evitar colocar cosas sobre los ojos o cerca de la zona**. Esto podría irritarles los ojos durante el tratamiento



Organice el transporte para ayudar a su ser querido para ir a las citas y regresar de ellas

Entre infusiones

El equipo de atención le recomendará a su ser querido qué gotas para los ojos usar en casa y entre las infusiones de Tivdak.

¿Cómo puede ayudar?

Asegúrese de que su ser querido se revise los ojos a diario. Esté atento a cualquier problema ocular nuevo o que empeore, como los que se mencionan a continuación:

- Sequedad ocular
- Irritación ocular
- Visión borrosa
- Enrojecimiento ocular
- Sensibilidad a la luz
- Pérdida o deterioro de la visión

Seguimiento de las gotas para los ojos

Ayude a su ser querido a mantenerse al tanto de sus horarios de las gotas para los ojos. El Eye Drop Tracker, ubicado en el [Folleto para pacientes](#), puede ayudarle con esto.

Si su ser querido experimenta cambios nuevos o que empeoran en sus ojos, **llame al equipo de atención de su ser querido de inmediato**

/ Otros **posibles efectos secundarios** de Tivdak

Los efectos secundarios graves de Tivdak pueden incluir problemas oculares, nerviosos (neuropatía periférica), de sangrado (hemorragia), pulmonares y reacciones cutáneas graves. Tivdak puede dañar al feto.

Los efectos secundarios más comunes de TIVDAK incluyen los siguientes:

- Disminución del recuento de glóbulos rojos
- Entumecimiento u hormigueo en manos o pies
- Problemas oculares (trastornos conjuntivales)
- Náuseas
- Cansancio
- Cambios en los análisis de sangre de la función hepática
- Hemorragia nasal
- Pérdida de cabello (alopecia)
- Sangrado (hemorragia)

Cualquiera de estas reacciones puede comenzar a suceder en los días posteriores a la infusión de su ser querido. Un efecto secundario no significa necesariamente que su ser querido deba suspender el tratamiento. Es posible que el oncólogo de su ser querido deba ajustar, pausar o suspender su tratamiento si presenta efectos secundarios nuevos o que empeoran.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de Tivdak. Para obtener más información, consulte la sección **Datos importantes** sobre Tivdak, incluida al final de este documento.

Controle a su ser querido.

Si nota algún efecto secundario, llame al equipo de atención de su ser querido de inmediato



No es un paciente o cuidador real.

/ ¿Qué otra cosa **puede hacer**?

Es posible que en ocasiones, su ser querido solo necesite hablar sobre lo que está pasando. Tal vez tenga miedos y preocupaciones que no siempre le resulta fácil compartir. Anímelo a ser abierto y honesto.

Colabore

Ayude a su ser querido con las tareas del hogar, como realizar las compras y limpiar

Planifique

Prepare comidas saludables para usted y su ser querido

Pida ayuda

Hay varios grupos que ofrecen atención y apoyo para usted y su ser querido. Consulte tivdak.com/resources-and-support para obtener una lista de recursos para pacientes y cuidadores

No puede cuidar a otra persona **si primero no se cuida a usted mismo**

Duerma bien. Dedique un tiempo para relajarse y recargar energías

Aliméntese bien y haga ejercicio. Mantenerse saludable es importante para poder cuidar a su ser querido, pero también para poder cuidarse a sí mismo

No sienta la presión de convertirse en un experto instantáneo. **Aprenda un poco cada día sobre Tivdak** y cómo puede ayudar a su ser querido



No es un paciente o cuidador real.

/ ¿Su ser querido **necesita ayuda** con el acceso y los costos de bolsillo del paciente?

Seagen Secure[®] ofrece asistencia a las pacientes inscritas*

Seagen Secure[®] es un programa de asistencia personalizada para personas a las que se les receta Tivdak. Cuando usted o su ser querido llamen a Seagen Secure[®], hablarán con un defensor del Acceso a servicios de oncología que puede responder sus preguntas y brindarles información sobre los recursos y la asistencia disponibles.[†]

Seagen Secure[®] tal vez pueda ayudarle si su ser querido cumple con las siguientes condiciones[‡]:

No tiene ningún seguro médico

No está seguro de si su seguro cubrirá su terapia

Necesita ayuda para pagar los costos de bolsillo del paciente



Llame al **855-4SECURE** (855-473-2873) para saber cómo inscribir a su ser querido en **Seagen Secure[®]**

*Se aplican criterios de elegibilidad. La asistencia financiera se puede brindar a través de organizaciones de terceros que tienen sus propios criterios de elegibilidad y procesos de inscripción. Pfizer no garantiza que la inscripción resulte en asistencia o reembolso.

[†]La información proporcionada por un defensor del Acceso a servicios de oncología no pretende sustituir el consejo clínico de su proveedor de atención médica. Consulte cualquier pregunta que pueda tener sobre su enfermedad y su tratamiento con su equipo de atención médica.

[‡]Programas Seagen Secure[®] disponibles para pacientes que califican. Pfizer no garantiza que la inscripción resulte en cobertura, reembolso o asistencia financiera.

No es un paciente o cuidador real.

tivdak[®]

tisotumab vedotin-tftv
inyectable de 40 mg



© 2024 Pfizer Inc. y Genmab A/S. Todos los derechos reservados. US-TVP-23-360-MT
Tivdak y su logotipo, y Seagen Secure y su logotipo, son marcas comerciales registradas en EE. UU. de
Seagen Inc. Genmab y sus logotipos son marcas comerciales de Genmab A/S o sus subsidiarias.

Consulte la [Información de seguridad importante](#) en las páginas 1 a 3, y lea la sección [Datos importantes](#) sobre TIVDAK, incluida la ADVERTENCIA IMPORTANTE para problemas oculares, al final de este documento.

Datos importantes

Este es solo un resumen de información importante sobre TIVDAK. Hable con su equipo de atención o con su farmacéutico para obtener más información.

tivdak
tisotumab vedotin-tftv
inyectable de 40 mg

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre TIVDAK?

TIVDAK puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

Problemas oculares. Los problemas oculares son comunes con TIVDAK y también pueden ser graves. TIVDAK puede causar cambios en la superficie del ojo que pueden provocar sequedad, enrojecimiento, irritación, úlceras corneales, visión borrosa y pérdida grave de la visión. **Informe a su proveedor de atención médica si desarrolla cambios en la visión o problemas oculares nuevos o que empeoran durante el tratamiento con TIVDAK.**

- Su proveedor de atención médica lo enviará a un especialista de la vista para que le revise los ojos antes de comenzar el tratamiento con TIVDAK, antes de cada infusión durante sus primeras 9 infusiones de TIVDAK y, según sea necesario, a fin de detectar cualquier signo o síntoma de problemas oculares nuevo o que empeore.
- Su proveedor de atención médica le preguntará si tiene algún signo o síntoma de problemas oculares antes de cada infusión. Lo derivarán a un especialista de la vista si detecta signos o síntomas nuevos o que empeoran de problemas oculares.
- Su proveedor de atención médica le recetará 3 tipos diferentes de gotas para los ojos antes de comenzar el tratamiento con TIVDAK. **Lleve consigo las gotas para los ojos a cada infusión y úselas según las indicaciones de su proveedor de atención médica para reducir el riesgo de problemas oculares:**
 - Use 1 gota de colirio con esteroides en cada ojo antes de cada infusión y continúe usando las gotas para los ojos 3 veces al día durante 3 días después de cada infusión.
 - Use gotas vasoconstrictoras para los ojos justo antes de cada infusión.
 - Use gotas lubricantes para los ojos durante todo el tratamiento y 30 días después de su última dosis de TIVDAK.
- **No** use lentes de contacto durante su tratamiento con TIVDAK a menos que se lo indique su especialista de la vista.

Consulte “¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de TIVDAK?” para obtener más información sobre los efectos secundarios.

¿Qué es TIVDAK?

TIVDAK es un medicamento recetado que se usa para tratar a adultas con cáncer de cuello uterino:

- que ha regresado o se ha extendido a otras partes del cuerpo, y
- quienes han recibido quimioterapia que no funcionó o ya no funciona.

Se desconoce si TIVDAK es seguro y eficaz en niños.

Antes de recibir TIVDAK

Informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso ante las siguientes situaciones:

- antecedentes de problemas de visión u oculares
- entumecimiento u hormigueo en manos o pies
- los problemas de sangrado
- problemas hepáticos
- embarazo o planes de quedar embarazada. TIVDAK puede dañar al feto. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si queda embarazada o cree que podría estarlo durante el tratamiento con TIVDAK.

Mujeres que pueden quedar embarazadas:

- Su proveedor de atención médica debe realizarle una prueba de embarazo antes de comenzar el tratamiento con TIVDAK.
- Debe utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y 2 meses después de su última dosis de TIVDAK.

Hombres con parejas femeninas que pueden quedar embarazadas:

- Debe utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y 4 meses después de su última dosis de TIVDAK.
- está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si TIVDAK pasa a la leche materna. No amamante durante el tratamiento y 3 semanas después de su última dosis de TIVDAK.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. Tomar TIVDAK con algunos otros medicamentos puede causar efectos secundarios.

¿Cómo recibiré TIVDAK?

- TIVDAK se le administrará mediante infusión intravenosa (IV) en una vena durante 30 minutos.
- Por lo general, TIVDAK se administra cada 3 semanas.
- Su proveedor de atención médica decidirá cuántas infusiones necesita.
- Su proveedor de atención médica le colocará compresas frías en los ojos durante cada infusión.
- Su proveedor de atención médica puede disminuir su dosis, suspender de manera temporal o por completo el tratamiento con TIVDAK si tiene efectos secundarios.

Datos importantes

Este es solo un resumen de información importante sobre TIVDAK. Hable con su equipo de atención o con su farmacéutico para obtener más información.

tivdak
tisotumab vedotin-tftv
inyectable de 40 mg

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de TIVDAK?

TIVDAK puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- Consulte “¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre TIVDAK?”
- **Neuropatía periférica.** Los problemas nerviosos, denominados neuropatía periférica son comunes con TIVDAK y también pueden ser graves. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si siente entumecimiento u hormigueo en manos o pies, o debilidad muscular.
- **Sangrado (hemorragia).** Los problemas de sangrado son frecuentes con TIVDAK y también pueden ser graves. Informe a su proveedor de atención médica u obtenga ayuda médica de inmediato si presenta signos o síntomas de sangrado durante el tratamiento con TIVDAK, entre los que se incluyen los siguientes:
 - sangre en las heces o heces negras (que se parecen al alquitrán)
 - sangre en la orina
 - tos o vómitos con sangre
 - sangrado vaginal inusual
 - cualquier sangrado inusual o abundante
- **Problemas pulmonares.** TIVDAK puede causar una inflamación de los pulmones grave o potencialmente mortal que puede provocar la muerte. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o que empeoran, como dificultad para respirar, falta de aire o tos.
- **Reacciones cutáneas graves.** TIVDAK puede causar reacciones cutáneas graves o potencialmente mortales que pueden provocar la muerte. Informe a su proveedor de atención médica u obtenga ayuda médica de inmediato si presenta signos o síntomas de reacción cutánea grave durante el tratamiento con TIVDAK, entre los que se incluyen los siguientes:
 - reacciones cutáneas que parecen anillos (lesiones diana)
 - sarpullido o picazón que continúa empeorando
 - ampollas o descamación de la piel
 - llagas o úlceras dolorosas en la boca, nariz, garganta o área genital
 - fiebre o síntomas similares a los de la gripe
 - ganglios linfáticos inflamados

Los efectos secundarios más comunes de TIVDAK incluyen los siguientes:

- disminución del recuento de glóbulos rojos
- entumecimiento u hormigueo en manos o pies
- problemas oculares (trastornos conjuntivales)
- náuseas
- cansancio
- cambios en los análisis de sangre de la función hepática
- hemorragia nasal
- pérdida de cabello (alopecia)
- sangrado (hemorragia)

TIVDAK puede causar problemas de fertilidad en mujeres y hombres, lo que puede afectar su capacidad para tener hijos. Hable con su proveedor de atención médica si esto le preocupa.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de TIVDAK.

Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088.

Información general sobre el uso seguro y eficaz de TIVDAK

En ocasiones, los medicamentos se recetan para fines distintos a los enumerados en una Guía de medicamentos. Si desea obtener más información sobre TIVDAK, hable con su proveedor de atención médica. Puede pedirle a su farmacéutico o proveedor de atención médica información sobre TIVDAK escrita para profesionales de la salud.

¿Cuáles son los ingredientes de TIVDAK?

Ingrediente activo: tisotumab vedotina-tftv

Ingredientes inactivos: d-manitol, l-histidina, monoclóridato de l-histidina y sacarosa.

Obtenga más información

- Este es solo un resumen de información clave sobre TIVDAK
- Consulte con su proveedor de atención médica o farmacéutico para obtener más información.
- Haga clic [aquí](#) o visite tivdak.com para obtener la [Guía de medicamentos](#) para pacientes de TIVDAK o información escrita para profesionales de la salud llamada [Información de prescripción completa](#)
- Si necesita ayuda para pagar sus medicamentos, visite SeagenSecure.com y consulte la información sobre el programa

Visite tivdak.com para obtener más información o llame al 1-855-4SEAGEN.

